



www.ceo.org.br



Versão com lista
adicional no final

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs



DINÊILA CAMPOS RIBEIRO VIDEIRA - Membro do CEO
FÁBIO FERRÃO VIDEIRA - Biólogo Presidente do CEO

PARCERIA:

Centro de Estudos Ornitológicos
Reservas Particulares do Patrimônio Natural de Alterosa
Prefeitura Municipal de Alterosa - Minas Gerais



Casal elaborador

DINÊILA CAMPOS RIBEIRO VIDEIRA
Ambientalista Membro do CEO

FÁBIO FERRÃO VIDEIRA
Biólogo Presidente do CEO

Participação especial
MARCELO MENDES DE ALMEIDA
Técnico Agropecuário

Revisão:

Ornitológica

Geral

LUIZ FERNANDO DE ANDRADE FIGUEIREDO
Médico e Observador de Aves
- 1º Secretário do CEO


IRENE DE LACERDA RAMOS
Professora Mestre em Química Ambiental

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs



FONTENELE
PUBLICAÇÕES

São Paulo - 2020



Poema dedicado aos meus pais, Fábio Ferrão e Dinêila, e ao amor que possuem pelo meio ambiente.

Entre os jatobás, o sabiá canta em seu altar.
No Lago do Amor, os dois amantes a se beijar;
Em uma dança meticulosa as folhas a se agitar;
Onde o sino da Capela São Francisco badala sem parar,
Enquanto no céu, as andorinhas desatam a voar;
E enfim, ao anoitecer, a coruja pia ao luar.

Bruna Ferrão

(Escritora do Livro "A Águia de Prata - Águias Imortais" e estudante Universitária em Jornalismo)

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Copyright © 2020 por Dinêila Campos Ribeiro Videira e Fábio Ferrão Videira
Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Dinêila Campos Ribeiro Videira
Fábio Ferrão Videira

1ª Edição
Outubro de 2020

Edição
Fontenele Publicações

Revisão:
Luiz Fernando de Andrade Figueiredo
Irene de Lacerda Ramos

Diagramação:
Marcos Dignes

EBOOK ISBN: 978-65-5871-034-9

CIP – (Cataloguing-in-Publication) – Brasil – Catalogação na
Publicação
Ficha Catalográfica feita na editora

VIDEIRA, Dinêila Campos Ribeiro e VIDEIRA, Fábio Ferrão

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs / Dinêila Campos Ribeiro
Videira e Fábio Ferrão Videira. / 1 ed. São Paulo, Fontenele Publicações,
2020.

197 p.; E-book;

EBOOK ISBN 978-65-5871-034-9

CDD 590

Índice para catálogo sistemático

1. Animais - Guia de Aves. 2. Pássaros.
3. Animais - Aves de Alterosa e suas RPPNs. I. Título

Fontenele Publicações

Rua Andaraí, 910 – Vila Maria – São Paulo-SP – CEP: 02.117-001

WhatsApp: 11 9-8635-8887

São Paulo: 11 4113-1346

contato@fontenelepublicacoes.com.br

Introdução

O estudo em questão começou após o casal pesquisador, Dinêila Campos Ribeiro Videira e Fábio Ferrão Videira, iniciarem em 1998 o processo junto ao IEF (Instituto Estadual de Florestas do Estado de Minas Gerais) para transformar parte da propriedade rural que tinham no Distrito do Divino Espírito Santo, conhecido popularmente como Cavacos, município de Alterosa / MG, em Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, baseado no Decreto Estadual MG nº 39.401, de 21/01/1998 e demais normas legais e regulamentares.

Foi difícil para o órgão público ambiental do estado de Minas Gerais entender o que era perpetuar as áreas pretendidas em RPPN, pois seriam os primeiros casos ocorridos na região do Sul de Minas, estendendo assim o processo por quase três anos, porém em 26 de dezembro de 2001 foram publicados no Diário Oficial de Minas Gerais os devidos reconhecimentos das três Reservas Particulares do Patrimônio Natural no município de Alterosa, sendo duas de propriedade do casal pesquisador (*RPPN Josepha Mendes Ferrão com 0,55 ha e RPPN São Francisco de Assis com 4,20 ha*) e outra do David Ricci Justino, grande amigo do casal (*RPPN Instituto Olho D'Água com 2,10 ha*), a qual foi recentemente adquirida por Dinêila e Fábio Ferrão.

Para melhor entendimento, a RPPN é uma categoria de Unidade de Conservação (UC) particular, criada por iniciativa do proprietário e reconhecida pelo poder público. Não há exigências quanto ao tamanho, já que a sua criação depende apenas do desejo do proprietário. A RPPN pode ser criada em áreas rurais ou urbanas. Além de preservar belezas cênicas e ambientais históricos, as RPPNs assumem, cada vez mais, proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos, entre vários outros serviços ambientais, desde que sejam autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento. Poderá haver nas RPPNs atividades recreativas, turísticas, educativas e de pesquisa. Informações adicionais poderão ser obtidas nos órgãos governamentais ambientais e também em organizações civis ambientais.

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Somado a isso, foi adquirido pelo casal responsável por este estudo, outra área nas proximidades das RPPNs, sendo 89% de uma área de 7,16 ha, transformada em Reserva Legal (RL), conforme Decreto Estadual MG nº 33.944, de 18/09/92, com intenção futura de reconhecê-la em RPPN, propriedade essa chamada de “*Reserva Legal Pousada dos Tucanos*”, decorrente do avistamento de dezenas de tucanuços (*Ramphastos toco*) que pousaram em um determinado dia, sobre as árvores lá existentes, emocionando o casal pesquisador. Atualmente essa propriedade foi doada ao Dimas dos Reis Ribeiro (irmão da Dinêila), almejando sua conservação e preservação como reserva ambiental.

No município de Alterosa, em suas florestas naturais e exóticas, nas RPPNs mencionadas, bem como nas reservas legais ou em represas, lagos, rios, fazendas, sítios e chácaras, existe uma rica e abundante fauna silvestre, com presença de grandes e pequenos animais, como tatu-peba, tatu-galinha, tatu-canastra, tatu-de-rabo-mole, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, veado-campeiro, anta, cachorro-do-mato, cachorro-vinagre, lobo-guará, jaguatirica, gato-mourisco, suçuarana, saruê, lebre, macaco-prego, sagui-dos-tufos-pretos, lontra, rato-silvestre, morcegos, lagarto-teiú, serpentes, entre muitos outros animais selvagens. Porém, no presente estudo destacaremos a “AVIFAUNA” - conjunto das aves de uma região, mais precisamente a fauna ornitológica regional (Ferrão-Videira 2010).

“A avifauna desperta nas pessoas o interesse por sua beleza, comportamento, carisma e vocalização, bem como por sua correlação com a flora e demais elementos da fauna, motivando-nos a promover ações para preservar e conservar o meio ambiente” (Videira 2020).

Curiosidade: O Fábio Ferrão e a Dinêila, com a colaboração de amigos e parentes, plantaram aproximadamente 12.000 mudas arbóreas nativas nas reservas ambientais referenciadas (RPPNs e RL), com o objetivo de potencializar a oferta alimentar a fauna silvestre do município e região. Também construíram entre os anos de 1998 a 2000, a “*Capela São Francisco de Assis*” no interior do Sítio Videira, propriedade onde se localiza a RPPN *Josepha Mendes Ferrão*, atualmente pertencente ao casal Marcelo e Dinalva, compadres de Dinêila e Fábio Ferrão. A capela possui dois compartimentos no sótão destinados à reprodução de aves silvestres. Um orgulho ambiental local.

Dedicatória

Ao Tio Tonho (Antônio Campos Nogueira Sobrinho) *“in memoriam”*, pela amizade e saudade. Infelizmente faleceu durante a elaboração do presente guia de aves (1949 - 2020).

Aos nossos queridos filhos Bruna e Arthur.

Aos nossos pais, Maria Campos Ribeiro e Nadir de Lima Ribeiro *“in memoriam”* (1939 - 1990); e Luzia Fátima Ferrão Videira e João Videira *“in memoriam”* (1943 - 2007).

Aos nossos amigos fiéis que sempre nos apoiam.

Ao amigo, compadre Marcelo Almeida, pela participação no levantamento das aves constantes neste guia.

Ao amigo Luiz Fernando pela ajuda na revisão técnica das espécies do guia.

À amiga professora Irene Ramos pela revisão ortográfica e geral do guia.

À amiga Fabíola Campos, artista plástica, que providenciou a pintura da capa deste guia.

Ao grande amigo David Ricci, que doou várias mudas arbóreas para o plantio na RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Ao grande amigo e compadre Rafael Shoji pela significativa ajuda na construção da Capela São Francisco de Assis.

Ao amigo Padre Donizete Antônio Garcia, pelo apoio a este projeto de estudo.

Ao Tio Orlando Rodrigues, pelo constante apoio nos assuntos ambientais.

Aos patrocinadores, pessoas físicas e jurídicas.

A todos(as) os(as) amigos(as) integrantes do Centro de Estudos Ornitológicos.

Aos(as) amigos(as) da OSCIP Ecolmeia.

Informações complementares

O presente guia potencializa a publicidade das ações que o Centro de Estudos Ornitológicos - CEO vem realizando nos últimos 36 anos de existência na ornitologia brasileira, com objetivo de congregiar pessoas interessadas na observação de aves e temas correlacionados, contribuindo para a conservação da natureza em geral e das aves em particular, além de colaborar com a promoção da educação ambiental da população.

A região *core* do estudo, é o município de Alterosa e suas RPPNs, possuindo diversos *habitat*, os quais contribuem para uma rica e variada avifauna.


Ressalta-se que o presente estudo não está concluído, considerando haver muito mais espécies de aves que ainda não foram catalogadas na região estudada.

Este estudo científico atende toda a nomenclatura e ordem sistemática padronizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, possibilitando aos munícipes de Alterosa e de seu Distrito, terem conhecimento da avifauna local de forma correta e didática, por meio de fotos, informações e direcionamentos para *links* que possibilitem escutar a vocalização da ave e acrescer mais informações sobre ela, o que torna este Guia um excelente material educativo que poderá ser utilizado por qualquer pessoa. Portanto, este estudo é motivador de importantes reflexões a respeito da natureza, sobre nossa relação com ela e nosso comprometimento com o seu futuro, sendo um interessante auxílio a ser explorado junto aos alunos das escolas de Alterosa.

Portanto, esperamos que este guia estimule outros proprietários de imóveis rurais a transformarem parte de suas propriedades em RPPN, da mesma forma que fizemos, possibilitando o aumento de áreas destinadas à conservação e preservação ambiental na região. Almejamos, ainda, que a Prefeitura Municipal de Alterosa colabore ajudando na realização da manutenção das cercanias e confecções de placas para as RPPNs, decorrente do recurso de ICMS-Ecológico que o município recebe há mais de uma década do Governo Estadual de Minas Gerais, justamente por possuir na área do município, essas 3 (três) RPPNs, recurso esse que nunca foi repassado para a manutenção e conservação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs em pauta.

Boa leitura.

Município de Alterosa



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alterosa#/media/Ficheiro:MinasGerais_Municip_Alterosa.sv

Coordenadas	 21° 14' 56" S 46° 08' 34" O
País	Brasil
Unidade federativa	Minas Gerais
Região intermediária	Varginha
Região imediata	Alfenas
Municípios limítrofes	Carmo do Rio Claro, Alfenas, Areado, Monte Belo, Nova Resende e Conceição da Aparecida
Distância até a capital Belo Horizonte	324 km
Distância até a cidade de São Paulo	342 km

Fonte adaptada: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Alterosa>

Unidades de Conservação em destaque RPPNs e RL



Vista aérea da área rural do Distrito do Divino Espírito Santos (Cavacos), município de Alterosa - MG, onde estão localizadas as Reservas em destaque do presente estudo.


Fonte: Google Maps. 2019.



RPPN Instituto Olho D'Água



RPPN São Francisco de Assis



RPPN Josepha Mendes Ferrão (Lago do Amor)



RL Pousada dos Tucanos

Capela São Francisco de Assis



Essa Capela foi projetada pelo casal pesquisador do presente estudo, com 2 (dois) compartimentos no sótão, destinados à reprodução de aves silvestres, permitindo repouso, abrigo, moradia e nidificação da avifauna silvestre local de vida livre.



Curiosidade: Já foram encontradas as seguintes espécies de aves utilizando a Capela como, a suindara, pica-pau-do-campo, periquitão, canário-da-terra, corruíra, suiriri-cavaleiro, bem-te-vi, joão-de-barro, noivinha-branca, entre outras que frequentam a Capela. Vespas e abelhas nativas também utilizam o local.

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

AGRADECIMENTO

Autoridades do Município

Dimas dos Reis Ribeiro - ex-prefeito de Alterosa (2001 - 2004 e 2005 - 2008)
Marcelo Nunes de Souza - ex-prefeito de Alterosa (2009 - 2012 e 2013 - 2016)
Hermes de Souza Silva - Prefeito de Alterosa (2017 - 2020)
Abimael Moreira Pinto - Vice-prefeito de Alterosa (2017 - 2020)
Edson João Batista - Presidente da Câmara dos Vereadores de Alterosa (2017 - 2020)
Vitor Campos Sobrinho - ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Alterosa
Kléber Olegário da Silva - Vereador de Alterosa (2017 - 2020)
Mauro Gil Campos de Oliveira - ex-vereador e Assessor Jurídico do Município de Alterosa
Leidinéia Vita Ruela Cabral - Secretária Municipal de Educação de Alterosa
Vanusa Aparecida Ruela - Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação
Elaine Aparecida Cabral - Diretora da E.M. Secretário Olinda de Andrade
Juliana Barbosa Prado - Diretora da E.M. Pingo de Gente
Patrícia Cristina De Ávila Vilela - Diretora da E.M. Profª Yolanda Dias Ribeiro
Sirlene Aparecida Moreira Ferreira - Diretora da E.M. Profª Ivone Martins Faloni Ferreira
Ana Cláudia Pereira Oliveira - Diretora do CEMEI Rosalina Moreira Vieira
Solange do Rosário Ferreira - Diretora do CEMEI Profª Andréa de Souza Coutinho

Autoridades do Estado

Romeu Zema Neto - Governador do Estado de Minas Gerais (2019- 2023)
Paulo Eduardo Rocha Brant - Vice-governador do Estado de Minas Gerais (2019- 2023)
Antônio Augusto Melo Malard - Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF
José Luciano Pereira - Diretor Geral do IEF na época do reconhecimento das RPPNs de Alterosa
Ana Carolina Franca Seleme - Chefia de Gabinete do IEF
Cláudio Vieira Castro - Diretoria de Unidades de Conservação do IEF
Mariana Lima Moura - Gerência de Criação de UC e Implantação de Manejo do IEF
Anderson Ramiro Siqueira - Supervisor Regional da URFBio Sul / IEF
Júlio César Moura - ex-chefe da Agência do IEF de Alfenas, atual Técnico da SMA de Alfenas
Nilson José de Souza - Diretor da E.E. Bolivar Boanerges da Silveira
Raquel Santos Gomes Nobre - Diretora da E.E. Jales Machado
Comando de Policiamento de Meio Ambiente (CPMAmb) da PMMG
Polícia Militar de Minas Gerais - 2 GP/4 Pel/291 Cia PM- Alterosa

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

RPPNs em destaque no presente estudo

RPPN - Instituto Olho D'Água, com 21.000 m²- criada pela Portaria n° 148, de 26-12-2001
RPPN - Josepha Mendes Ferrão, com 5.500 m²- criada pela Portaria n° 149, de 26-12-2001
RPPN - São Francisco de Assis, com 42.000 m²- criada pela Portaria n°145, de 26-12-2001

Reserva Legal em destaque no presente estudo

RL - Pousada dos Tucanos, com 71.600 m²

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ESTUDO

Atividades de campo

Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira
Bruna Campos Ribeiro Ferrão Videira

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Dinêila Campos Ribeiro Videira
Fábio Ferrão Videira
Marcelo Mendes de Almeida

Artista plástica responsável pela obra de arte da capa

Fabíola Campos

Autora do poema

Bruna Campos Ribeiro Ferrão Videira

Desenho das orientações sobre a morfologia das aves

Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira

Fotógrafos(as) que autorizaram utilizar as fotos das aves

Cárin Cristina Orsi Duarte
Caroline Avelar
Constantino Melo
Emerson Panis Kaseker
Evaldo Cesari de Oliveira Junior
Fábio Ferrão Videira
Flavio Guglielmino
Jarbas Mattos
Luciano Vasconcelos Monferrari
Luiz Fernando Bravo
Luiz Fernando de Andrade Figueiredo
Maria das Graças Albers
Mario Sergio Olyntho
Silvia Cristina Faustino Linhares de Albuquerque

Revisão ornitológica

Luiz Fernando de Andrade Figueiredo

Revisão ortográfica e geral

Irene de Lacerda Ramos

Colaboradores do Wikiaves

Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira
Caroline Avelar
Dinêila Campos Ribeiro Videira
Elisabeth Fernandes
Fábio Ferrão Videira
Joelma do Couto
Marcelo Mendes de Almeida
Mario Lucio da Silva
Reinaldo C. Junior
Reinaldo César Guedes
Rodolfo Nadai
Silvia Faustino Linhares
Thiago F. Martins

ASSOCIADOS DO CENTRO DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS - CEO

Diretoria do Centro de Estudos Ornitológicos

PRESIDENTE: Fábio Ferrão Videira

SECRETÁRIO: Luiz Fernando de Andrade Figueiredo

PRIMEIRA TESOUREIRA: Cárin Cristina Orsi Duarte

SEGUNDO TESOUREIRO: André Ricardo de Souza

Conselho Fiscal do Centro de Estudos Ornitológicos

Claudia Oliveira de Almeida

Ernesto Lipmann

June Lorraine Rodrigues Alves

Luciano Vasconcelos Monferrari

Maria Aparecida Visconti

Membros Honorários do Centro de Estudos Ornitológicos

Caetano Beccary - "*in memoriam*" (1924 - 2020)

Hélio Ferraz de Almeida Camargo - "*in memoriam*" (1922 - 2006)

Liliana Forneris - "*in memoriam*" (19... - 2020)

Luiz Fernando de Andrade Figueiredo

Rolf Grantsau - "*in memoriam*" (1928 - 2015)

Membros Associados do Centro de Estudos Ornitológicos

Adilson Paulo Prudente do Amaral

Alvaro Antonio de Almeida Nascimento Silva

André Perez

Andre Ricardo de Souza

Antônio Marcos Zenaro

Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira

Bruna Campos Ribeiro Ferrão Videira

Bruno Arantes de Andrade Bueno

Cárin Cristina Orsi Duarte

Carlos Eduardo Godoy

Carlos Otávio Araujo Gussoni

Celisa Tiemi Nakagawa Sera

Cibele Aparecida Fabichak

Cintia Pedroso

Claudia Oliveira de Almeida

Cláudia Patrícia Pereira Monferrari

Dinêila Campos Ribeiro Videira

Douglas Takao Miyata

Ernesto Lippmann

Evaldo Cesari de Oliveira Junior

Fábio Ferrão Videira

Fabíola de Campos Lima

Frederico Dentello

Gilberto Casarin Lima

Gilberto Correa da Rocha Lima

Herbert Otto Roger Schubart

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Irene de Lacerda Ramos
João Paulo Marigo Cerezoli
José Eduardo Rodrigues Martins
Julio Guedes Filho
June Lorraine Rodrigues Alves
Kelly Caroline Soares Pereira
Luciana Bianchini
Luciano Vasconcelos Monferrari
Luis Carlos de Souza Ferreira
Luís Gonzaga Truzzi “Zaga”
Luiz Fernando de Andrade Figueiredo
Manoel dos Santos Correia “Manequinho”
Marcelo Mendes de Almeida
Marcos Henrique Achado
Maria Antonietta Castro Pivatto
Maria Aparecida Visconti
Maria das Graças Albers
Mario Sergio Olyntho
Marta Brito Guimarães
Massaaki Sera
Monica Guitian Ruiz
Norton Marcus Vinícius dos Santos
Oliver Prioli
Paulo Roberto de Moura
Pérola Maria Visconti
Peter Mix
Raquel Colombo Oliveira
Ricardo Pires de Campos
Rochely Santos Morandini
Sandra Césari
Silvia Cristina Faustino Linhares de Albuquerque
Sulamit Meca Pedrassoli

APOIO E PATROCÍNIO

Apoiadores do Projeto

Ademilson dos Santos
Adriana Galvão
Agatha Dayane Hirai
Airton Aparecido Siqueira
Airton Grazioli
Alberto Amaro Canales dos Santos
Alexandre Carlos Siqueira de Souza
Alexsander Zamorano Antunes
Ana Maria Brischi
André Luiz Magri
Andréa Soares Pires
Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães
Angelica Aiko Ricci Justino

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Antonio Angelo dos Santos
Antonio Manoel Esteves
Antônio Martins Tieppo
Beatriz Maria Nunes Videira
Celso Rubens de Palma
Cidinei Hidalgo Ramos
Claudinea Cristina Ruela
David Ricci Justino
Dilane Cristina Ribeiro
Dilson Campos Ribeiro
Dimas dos Reis Ribeiro
Dinalva Andréa Ribeiro de Almeida
Donizete Antônio Garcia
Edilson Ovidio de Melo
Edson Luiz do Vale Hernandez
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho
Elaine Santos
Elisa de Moraes Ferreira Ribeiro
Evaldo Eziquiel da Silva
Fernanda Delborgo Abra
Flávia Regina Fernandes Fragoso
Francisco Acácio de Freitas Oliveira Filho
Gabriel Nunes Videira
Gilberto Jorge Curi
Gilberto Natalini
Gláucio Nunes Videira
Guilherme Brandão do Amaral
Henrique Ferraz
Izabela Cristina Nunes da Silveira
J. Alexandre Rocha Soares
Jair Teixeira Terra Filho
João da Silva Pereira
José Donizete Esteves
José Jorge Resende
José Paccini Ferreira
José Roberto Silva Dias
José Tadeu Silva Pereira
Larissa Campos Ribeiro
Laura Ribeiro de Almeida
Laura Rodrigues Ferrão Videira
Letícia Bolian Zimback
Letícia Campos Ribeiro
Letícia Verônica Nunes Videira
Lia Shoji
Linda Lacerda da Silva
Livia Maria Perancini Fernandes
Lucas Borges Barbosa
Lucas Ribeiro de Almeida
Lucas Shoji

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Luciano Ramos Zandoná
Luiz Roberto Pivelli
Luiza Perancini Fernandes
Luzia Fátima Ferrão Videira
Malcolm Forest
Manuella Hirai Nunes
Marcelo Batista dos Reis
Marcelo Ricardo Mariano
Marcos Celso Alves de Oliveira
Marcos Vinícius Nunes da Silveira
Maria Campos Ribeiro
Maria Olivia Souza Resende
Matheus Nunes da Silveira
Maurício Domingues Ferreira
Michel Frik
Milena Campos Ribeiro
Nadir Otávio Ferreira Ribeiro
Orlando Rodrigues da Silva
Orlando Verducci Júnior
Paula Ribeiro Prist
Priscila Comassetto Maciel
Rafael Kenji Ricci Justino
Rafael Shoji
Ricardo Antonio Fernandes
Ricardo Dino Tonelli
Roberto J P Cimino
Rogério Ferrão Videira Filho
Rogério Moraes de Freitas
Rogério Morgado Jaime
Sandra Tizue Iizuka
Sânia de Moraes Ferreira Ribeiro
Sérgio Massamitsu Arimori
Sérgio Saraiva Martins
Soraia Rufino
Soraya Aparecida Terra
Virginia Morgado Frik
Vitor Perancini Fernandes
Wilson Roberto Batista dos Reis

Pessoas Físicas que colaboraram para custear as despesas com a editora

Dimas dos Reis Ribeiro
Dinêila Campos Ribeiro Videira
Fábio Ferrão Videira
Rafael Shoji
Sânia de Moraes Ferreira Ribeiro

Pessoas Jurídicas que colaboraram para custear as despesas com a editora

Consultoria e Assessoria Ambiental - Ferrão Videira
IMED - Instituto Maranhense de Educação Digital Limitada

Índice

Poema	3
Introdução	5
Dedicatória	7
Informações complementares	8
Município de Alterosa	9
Unidades de Conservação em destaque RPPNs e RL	10
Capela São Francisco de Assis	11
Orientações sobre a morfologia das aves	27

Nome popular

A

Águia-serrana	54
Alegrinho	126
Alma-de-gato	69
Andorinha-de-sobre-branco	151
Andorinha-do-campo	150
Andorinhão-do-temporal	77
Andorinha-pequena-de-casa	148
Andorinha-serradora	149
Anu-branco	71
Anu-preto	70
Arapaçu-de-cerrado	112
Arapaçu-grande	113
Arapaçu-rajado	111
Ariramba-de-cauda-ruiva	86
Avoante	67
Azulão	188

B

Bacurau	76
Baiano	181
Batuqueiro	185
Beija-flor-de-fronte-violeta	83
Beija-flor-de-orelha-violeta	80
Beija-flor-de-peito-azul	84
Beija-flor-tesoura	79
Beija-flor-tesoura-verde	82
Bem-te-vi	128
Bem-te-vi-rajado	130
Bentevizinho-de-penacho-vermelho	132
Besourinho-de-bico-vermelho	81

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Bico-chato-de-orelha-preta	121
Bico-virado-carijó	114
Bigodinho	180
Biguá	35

C

Cabeça-seca	34
Cambacica	179
Canário-da-terra	172
Canário-do-campo	184
Carão	55
Carcará	97
Cardeal-do-nordeste	168
Carrapateiro	98
Casaca-de-couro-da-lama	115
Choca-barrada	108
Choca-da-mata	109
Choquinha-lisa	107
Chupa-dente	110
Chupim	166
Chupim-do-brejo	165
Coleirinho	183
Colhereiro	45
Coró-coró	42
Corruíra	152
Coruja-buraqueira	75
Corujinha-do-mato	74
Curicaca	44
Curutié	119

E

Encontro	162
----------------	-----

F

Ferreirinho-relógio	123
Filipe	136
Fim-fim	190
Freirinha	139

G

Galinha-d'água	58
Garça-branca-grande	40
Garça-branca-pequena	41
Garça-moura	39
Garça-vaqueira	38

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Garibaldi	164
Gavião-caboclo	51
Gavião-carijó	52
Gavião-de-rabo-branco	53
Gavião-peneira	49
Gibão-de-couro	124
Gralha-do-campo	146
Gralha-piçaca	147
Guaracava-de-barriga-amarela	125

I

Inhambu-chororó	28
Irerê	29

J

Jaçanã	62
Jacuguaçu	32
Jandaia-de-testa-vermelha	102
Japacanim	153
Japu	161
João-bobo	87
João-botina-do-brejo	118
João-de-barro	116
João-de-pau	117
João-teneném	120
Juriti-pupu	68
Juruviara	145

L

Lavadeira-mascarada	138
---------------------------	-----

M

Maçarico-de-colete	61
Maracanã	100
Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	127
Maria-preta-de-penacho	141
Marreca-ananaí	31
Martim-pescador-verde	85

N

Neinei	131
Noivinha-branca	144

P

Papa-capim-de-costas-cinzas	182
Papagaio-verdadeiro	106
Pardal	191
Pássaro-preto	163
Pato-do-mato	30
Periquitão	101
Periquito-de-encontro-amarelo	105
Periquito-rei	103
Pernilongo-de-costas-brancas	60
Pica-pau-branco	90
Pica-pau-de-banda-branca	95
Pica-pau-de-cabeça-amarela	94
Pica-pau-do-campo	93
Pica-pau-pequeno	91
Pica-pau-verde-barrado	92
Picapauzinho-barrado	89
Pintassilgo	189
Polícia-inglesa-do-sul	167
Pomba-asa-branca	66
Pombo-doméstico	65
Primavera	143
Príncipe	137
Pula-pula	160

Q

Quero-quero	59
Quiriquiri	99

R

Rabo-branco-acanelado	78
Rolinha-fogo-apagou	64
Rolinha-roxa	63

S

Sabiá-barranco	154
Sabiá-do-campo	157
Sabiá-laranjeira	155
Sabiá-poca	156
Saci	72
Saí-andorinha	177
Saí-azul	178
Saí-canário	187
Saíra-amarela	171

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Sanhaço-cinzento	169
Sanhaço-do-coqueiro	170
Saracura-do-mato	56
Saracura-sanã	57
Seriema	96
Socó-dorminhoco	36
Socozinho	37
Sovi	50
Suindara	73
Suiriri	134
Suiriri-cavaleiro	129
Suiriri-de-garganta-branca	133
Suiriri-pequeno	142

T

Tapicuru	43
Teque-teque	122
Tesoura-do-brejo	140
Tesourinha	135
Tico-tico	158
Tico-tico-do-campo	159
Tico-tico-rei	175
Tico-tico-rei-cinza	174
Tiê-preto	176
Tiziu	173
Trinca-ferro	186
Tucanuçu	88
Tuim	104
Tuiuiú	33

U

Urubu-de-cabeça-vermelha	46
Urubu-preto	47
Urubu-rei	48

Autores e Elaboradores do Guia	192
Participação especial.....	192
Revisor Ornitológico.....	193
Revisora Geral.....	193
Referências.....	194
Patrocinadores.....	196
Apoio	196

Índice

Nome científico

A

<i>Amazilia lactea</i>	84
<i>Amazona aestiva</i>	106
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	31
<i>Ammodramus humeralis</i>	159
<i>Aramides saracura</i>	56
<i>Aramus guarauna</i>	55
<i>Aratinga auricapillus</i>	102
<i>Ardea alba</i>	40
<i>Ardea cocoi</i>	39
<i>Arundinicola leucocephala</i>	139
<i>Athene cunicularia</i>	75

B

<i>Basileuterus culicivorus</i>	160
<i>Brotogeris chiriri</i>	105
<i>Bubulcus ibis</i>	38
<i>Butorides striata</i>	37

C

<i>Cairina moschata</i>	30
<i>Calidris melanotos</i>	61
<i>Caracara plancus</i>	97
<i>Cariama cristata</i>	96
<i>Cathartes aura</i>	46
<i>Celeus flavescens</i>	94
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	119
<i>Chaetura meridionalis</i>	77
<i>Chloroceryle amazona</i>	85
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	81
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	164
<i>Coereba flaveola</i>	179
<i>Colaptes campestris</i>	93
<i>Colaptes melanochloros</i>	92
<i>Colibri serrirostris</i>	80
<i>Columba livia</i>	65
<i>Columbina squammata</i>	64
<i>Columbina talpacoti</i>	63
<i>Conopophaga lineata</i>	110
<i>Coragyps atratus</i>	47
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	175
<i>Coryphospingus pileatus</i>	174
<i>Crotophaga ani</i>	70
<i>Crypturellus parvirostris</i>	28
<i>Cyanocorax chrysops</i>	147
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	146
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	188

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

D

<i>Dacnis cayana</i>	178
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	113
<i>Dendrocygna viduata</i>	29
<i>Donacobius atricapilla</i>	153
<i>Dryocopus lineatus</i>	95
<i>Dysithamnus mentalis</i>	107

E

<i>Egretta thula</i>	41
<i>Elaenia flavogaster</i>	125
<i>Elanus leucurus</i>	49
<i>Emberizoides herbicola</i>	184
<i>Eupetomena macroura</i>	79
<i>Euphonia chlorotica</i>	190
<i>Eupsittula aurea</i>	103

F

<i>Falco sparverius</i>	99
<i>Fluvicola nengeta</i>	138
<i>Forpus xanthopterygius</i>	104
<i>Furnarius figulus</i>	115
<i>Furnarius rufus</i>	116

G

<i>Galbula ruficauda</i>	86
<i>Gallinula galeata</i>	58
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	53
<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	54
<i>Gnorimopsar chopi</i>	163
<i>Gubernetes yetapa</i>	140
<i>Guira guira</i>	71

H

<i>Heterospizias meridionalis</i>	51
<i>Himantopus melanurus</i>	60
<i>Hirundinea ferruginea</i>	124

I

<i>Icterus pyrrhopterus</i>	162
<i>Ictinia plumbea</i>	50

J

<i>Jabiru mycteria</i>	33
<i>Jacana jacana</i>	62

K

<i>Knipolegus lophotes</i>	141
----------------------------------	-----

L

<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	112
<i>Leptotila verreauxi</i>	68

M

<i>Machetornis rixosa</i>	129
<i>Megarynchus pitangua</i>	131
<i>Megascops choliba</i>	74
<i>Melanerpes candidus</i>	90
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	42
<i>Milvago chimachima</i>	98
<i>Mimus saturninus</i>	157
<i>Molothrus bonariensis</i>	166
<i>Mycteria americana</i>	34
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	127
<i>Myiodynastes maculatus</i>	130
<i>Myiophobus fasciatus</i>	136
<i>Myiozetetes similis</i>	132

N

<i>Nannopterum brasilianus</i>	35
<i>Nycticorax nycticorax</i>	36
<i>Nyctidromus albicollis</i>	76
<i>Nystalus chacuru</i>	87

P

<i>Pardirallus nigricans</i>	57
<i>Paroaria dominicana</i>	168
<i>Passer domesticus</i>	191
<i>Patagioenas picazuro</i>	66
<i>Penelope obscura</i>	32
<i>Phacellodomus ferrugineigula</i>	118
<i>Phacellodomus rufifrons</i>	117
<i>Phaethornis pretrei</i>	78
<i>Phimosus infuscatus</i>	43
<i>Piaya cayana</i>	69
<i>Picumnus cirratus</i>	89
<i>Pitangus sulphuratus</i>	128
<i>Platalea ajaja</i>	45
<i>Primolius maracana</i>	100
<i>Progne tapera</i>	150
<i>Psarocolius decumanus</i>	161
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	165
<i>Psittacara leucophthalmus</i>	101
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	148
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	137

R

<i>Ramphastos toco</i>	88
<i>Rupornis magnirostris</i>	52

S

<i>Saltator similis</i>	186
<i>Saltatricula atricollis</i>	185
<i>Sarcoramphus papa</i>	48
<i>Satrapa icterophrys</i>	142
<i>Serpophaga subcristata</i>	126

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

<i>Sicalis flaveola</i>	172
<i>Spinus magellanicus</i>	189
<i>Sporophila ardesiaca</i>	182
<i>Sporophila caerulescens</i>	183
<i>Sporophila lineola</i>	180
<i>Sporophila nigricollis</i>	181
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	149
<i>Sturnella superciliaris</i>	167
<i>Synallaxis spixi</i>	120

T

<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	151
<i>Tachyphonus coronatus</i>	176
<i>Tangara cayana</i>	171
<i>Tangara palmarum</i>	170
<i>Tangara sayaca</i>	169
<i>Tapera naevia</i>	72
<i>Tersina viridis</i>	177
<i>Thalurania furcata</i>	82
<i>Thalurania glaucopsis</i>	83
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	109
<i>Thamnophilus doliatus</i>	108
<i>Theristicus caudatus</i>	44
<i>Thlypopsis sordida</i>	187
<i>Todirostrum cinereum</i>	123
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	122
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	121
<i>Troglodytes musculus</i>	152
<i>Turdus amaurochalinus</i>	156
<i>Turdus leucomelas</i>	154
<i>Turdus rufiventris</i>	155
<i>Tyrannus albogularis</i>	133
<i>Tyrannus melancholicus</i>	134
<i>Tyrannus savana</i>	135
<i>Tyto furcata</i>	73

V

<i>Vanellus chilensis</i>	59
<i>Veniliornis passerinus</i>	91
<i>Vireo chivi</i>	145
<i>Volatinia jacarina</i>	173

X

<i>Xenops rutilans</i>	114
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	111
<i>Xolmis cinereus</i>	143
<i>Xolmis velatus</i>	144

Z

<i>Zenaida auriculata</i>	67
<i>Zonotrichia capensis</i>	158


Orientações sobre a morfologia das aves

Desenho: Arthur Ferrão

Inspirado no Guia de Campo Aves da Grande São Paulo.

(DEVELEY, P.F. e ENDRIGO, E.)

Também disponibilizado nos Guias de Aves da Invernada do Barro Branco; do Campo de Marte e do Complexo Militar do Cambuci. (VIDEIRA, F.F.)



- | | | | | | |
|---|-----------------|----|-----------------|----|--------------------|
| 1 | fronte; testa | 9 | barriga | 17 | uropígio |
| 2 | loro | 10 | tarso | 18 | dorso |
| 3 | maxila superior | 11 | dedo | 19 | coberteiras da asa |
| 4 | mandíbula | 12 | unha | 20 | pescoço |
| 5 | mento | 13 | flanco | 21 | nuca |
| 6 | garganta | 14 | rêmiges; asa | 22 | píleo |
| 7 | peito | 15 | crisso | | |
| 8 | encontro | 16 | retrizes; cauda | | |

Inhambu-chororó

[Retorne ao Índice](#)

Crypturellus parvirostris



Foto (macho): Cárin Duarte

O Inhambu-chororó é uma ave da família Tinamidae.

Alimenta-se de pequenas sementes diversas, somado a insetos e vermes. Possui o costume de procurar pequenos artrópodes e moluscos entre as folhas caídas no solo, revirando folhas e paus podres com o bico à procura de alimento.

É difícil avistá-lo por ser muito arisco, mas é encontrado em áreas de *Eucalyptus* próximo à RPPN Josepha Mendes Ferrão, bem como, em capoeiras nativas vizinhas da RPPN Instituto Olho D'Água.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/inhambu-chororo>

Irerê

[Retorne ao Índice](#)

Dendrocygna viduata



Foto: Silvia Faustino Linhares

O irerê é uma ave pertencente à família Anatidae.

Alimenta-se basicamente de plantas submersas e gramíneas nas margens dos lagos, lagoas e represas. É encontrado em vários locais no município de Alterosa e também no lago vizinho à RPPN Instituto Olho D'Água.

Ele é um pato silvestre muito popular em nosso país, costuma viver em bandos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/irere>

Pato-do-mato

Cairina moschata

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Ferrão

O pato-do-mato é uma ave percentente à família Anatidae.

Alimenta-se de raízes, sementes e folhas de plantas aquáticas, apanhadas flutuando ou através de filtragem da lama do fundo. Nada com a cabeça e pescoço afundados enquanto busca alimento.

É visto com grande frequência no açude do Sítio São Dimas e no lago da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/pato-do-mato>

Marreca-ananaí

[Retorne ao Índice](#)

Amazonetta brasiliensis



Foto (macho): Constantino Melo

A marreca-ananaí, também conhecida como pé-vermelho, é uma ave pertencente à família Anatidae.

Alimenta-se em banhados, em pequenas lagoas. Seu hábito alimentar constitui em folhagens, sementes e invertebrados.

Possui o costume de ficar grande parte do tempo, dentro da água e nas margens procurando alimento. Pode ser encontrada no lago vizinho a RPPN Instituto Olho D'Água.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pe-vermelho>

Jacuguaçu

Penelope obscura

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Ferrão

O jacuguaçu, conhecido também como jacuaçu, é uma ave de tamanho avantajado pertencente à família Cracidae.

Seu *habitat* está vinculado à floresta. É um animal frugívoro, embora, alimente-se também de folhas, brotos, grãos e insetos.

É encontrado nas RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água e na RL Pousada dos Tucanos no interior de suas florestas e em suas bordas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/jacuacu>

Tuiuiú

Jabiru mycteria

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O tuiuiú é uma ave da família Ciconiidae, bastante grande, chegando a um metro e sessenta centímetros de altura.

Alimenta-se de peixes, moluscos, répteis, insetos e até pequenos mamíferos.

Sua presença em Alterosa vem aumentando nos últimos anos, após a diminuição das águas na represa de Furnas.

Ave constante na lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do Estado de Minas Gerais, conforme Normativa COPAM Nº 147/2010 - IEF.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tuiuiu>

Cabeça-seca

Mycteria americana

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

O cabeça-seca é uma ave da família Ciconiidae, podendo chegar a um metro de comprimento.

Alimenta-se coletivamente, com vários indivíduos se deslocando lado a lado em água rasa, movimentando o fundo lodoso com um dos pés para deslocar as presas, como peixes, anfíbios, pequenos répteis e grandes invertebrados.

Sua presença em Alterosa vem aumentando nos últimos anos, juntamente com o tuiuiú.

Ave constante na lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do Estado de Minas Gerais, conforme Normativa COPAM Nº 147/2010 - IEF.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/cabeca-seca>

Biguá

[Retorne ao Índice](#)

Nannopterum brasilianus



Foto: Luiz Bravo

O biguá é uma ave aquática da família Phalacrocoracidae.

Alimenta-se de pequenos peixes e artrópodes aquáticos, como crustáceos.

É visto no açude do Sítio São Dimas, na RPPN Josepha Mendes Ferrão, bem como em outros locais, no braço da represa de Furnas que banha Alterosa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bigua>

Socó-dorminhoco

Nycticorax nycticorax

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

O socó-dorminhoco, também conhecido como savacu, pertence à família Ardeidae.

Alimenta-se de peixes, anfíbios, crustáceos, insetos, pequenos répteis e filhotes de outras aves.

É comum encontrá-lo próximo aos lagos e lagoas existentes no município de Alterosa, principalmente no braço da represa que divide Alterosa com Areado.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/savacu>

Socozinho

Butorides striata

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

O socozinho é uma ave da família Ardeidae e podemos encontrá-la próximo a lagos e lagoas de Alterosa.

Alimenta-se de peixes, insetos aquáticos, caranguejos, moluscos, anfíbios e répteis. Permanece imóvel por longos períodos, empoleirado sobre a água ou em suas proximidades à espera de presas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/socozinho>

Garça-vaqueira

Bubulcus ibis

[Retorne ao Índice](#)



Foto (em plumagem nupcial): Cárin Duarte

A garça-vaqueira é uma ave da família Ardeidae. É uma espécie que se dispersou no continente americano, vinda da África. No continente africano está sempre associada às manadas dos grandes herbívoros.

Caça seu alimento longe da água, insetívora, alimentando-se de insetos espantados pelo gado e também de moscas no dorso destes animais.

Bastante presente na área rural de Alterosa e em seu Distrito.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-vaqueira>

Garça-moura

Ardea cocoi

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

A garça-moura é uma ave da família Ardeidae, sendo a maior das garças do Brasil, com envergadura de um metro e oitenta centímetros.

Costuma ficar pousada nas margens dos rios e riachos existentes em Alterosa, inclusive é encontrada nas Reservas Ambientais em destaque neste estudo, em meio à vegetação, caçando peixes, sapos, rãs, pererecas, caranguejos, moluscos e pequenos répteis.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-moura>

Garça-branca-grande

Ardea alba

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

A garça-branca-grande é uma ave da família Ardeidae, podendo chegar a um pouco mais de um metro de comprimento.

Alimenta-se principalmente de peixes e, ainda, de pequenos roedores, anfíbios, répteis, insetos, além de pequenas aves.

É vista próximo aos lagos e lagoas existentes na área rural de Alterosa e Cavacos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-grande>

Garça-branca-pequena

Egretta thula

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

A garça-branca-pequena é uma ave da família Ardeidae. Apresenta bico e tarsos pretos e dedos dos pés amarelos.

Alimenta-se de peixes de forma bastante ativa. Aprecia também insetos, larvas, caranguejos, anfíbios e pequenos répteis.

Vive em grupos e se desloca em pequenas distâncias para dormir. Avistada nas bordas de lagos, rios e banhados existentes no município de Alterosa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-pequena>

Coró-coró

[Retorne ao Índice](#)

Mesembrinibis cayennensis



Foto: Jarbas Mattos

O coró-coró é uma ave pertencente à família Threskiornithidae.

Alimenta-se de invertebrados como minhocas, insetos, crustáceos e moluscos e, também, de plantas aquáticas.

É frequente encontrá-lo nas matas úmidas e escuras da Reserva Legal Pousada dos Tucanos e também nas RPPNs São Franciscos de Assis e Instituto Olho D'Água.

Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopéico “coró-coró”.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/coro-coro>

Tapicuru

Phimosus infuscatus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O tapicuru é uma ave da família Threskiornithidae.

Alimenta-se de crustáceos, moluscos, caranguejos e sementes e folhas.

É visto nos brejos da várzea do Sítio São Dimas e da Reserva Legal Pousada dos Tucanos. Também está presente na várzea próximo ao Cavacos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/tapicuru>

Curicaca

[Retorne ao Índice](#)

Theristicus caudatus



Foto: Ferrão

A curicaca é uma ave pertencente à família Threskiornithidae.

Seu nome popular é onomatopeico, semelhante ao som do seu canto.

Alimenta-se de artrópodes e pequenos vertebrados.

É avistada com frequência na várzea do Sítio São Dimas e também na da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/curicaca>

Colhereiro

Platalea ajaja

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

O colhereiro é uma ave da família Threskiornithidae.

Essa ave possui bico em forma de colher.

Alimenta-se peneirando a água, sacudindo e mergulhando o bico à procura de peixes, pequenos anfíbios, insetos, camarões, moluscos e crustáceos. É visto no braço da represa que divide Alterosa com Areado.

Ave constante na lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do Estado de Minas Gerais, conforme Normativa COPAM Nº 147/2010 - IEF.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/colhereiro>

Urubu-de-cabeça-vermelha

Cathartes aura

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O urubu-de-cabeça-vermelha é uma ave da família Cathartidae.

Alimenta-se de restos de outros animais sendo, portanto, “saprófaga”. Localiza carcaças pelo olfato bastante apurado.

Ocasionalmente pode capturar e matar pequenos vertebrados apanhados em voos rasantes.

É visto sobrevoando todo o município de Alterosa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeca-vermelha>

Urubu-preto

Coragyps atratus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

O urubu-preto, conhecido também como urubu-de-cabeça-preta, é uma ave pertencente à família Cathartidae

Os urubus possuem significativa importância na natureza, pois mantêm o ambiente limpo eliminando desde carcaças até ossos de animais mortos.

Ave do grupo dos abutres do Novo Mundo. Conhecido como urubu-de-cabeça-preta.

É comum encontrá-lo solitariamente ou em bandos nas áreas rurais de Alterosa, voando ou empoleirado nas árvores e cercas de mourões.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeça-preta>

Urubu-rei

Sarcoramphus papa

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O urubu-rei é uma ave da família Cathartidae.

Possui uma envergadura aproximada de dois metros.

Sua dieta é estritamente carnívora. Como consumidor de carne em putrefação, desempenha importante papel saneador na natureza.

Essa ave pode ser vista nas RPPNs São Francisco de Assis, Instituto Olho D'Água e Josepha Mendes Ferrão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-rei>

Gavião-peneira

Elanus leucurus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

O gavião-peneira é uma ave pertencente à família Accipitridae. Também conhecida como gavião-peneirador, peneira e peneireiro-cinzento.

Caça pairando no ar por longo período, a fim de examinar o chão em busca de pequenos vertebrados e artrópodes.

É comum encontrá-lo pairando nas proximidades das RPPNs de Alterosa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-peneira>

Sovi

Ictinia plumbea

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O sovi é uma ave pertencente à família Accipitridae.

Alimenta-se de formigas, cupins e outros insetos. Também captura pequenas presas nas copas de árvores, e pequenos lagartos e cobras no chão.

Costuma ser visto nas bordas da mata da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sovi>

Gavião-caboclo

[Retorne ao Índice](#)

Heterospizias meridionalis



Foto: Ferrão

O gavião-caboclo é uma ave pertencente à família Accipitridae.

Alimenta-se de várias presas, como pequenos mamíferos, aves, cobras, lagartos, rãs, sapos e grandes insetos. Na baixa das águas, apanha caranguejos.

Ave bastante comum na região de Alterosa, é encontrada voando e empoleirada nas árvores, mourões, postes, entre outros locais, inclusive presente nas RPPNs de Alterosa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/gaviao-caboclo>

Gavião-carijó

Rupornis magnirostris

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Mario Olyntho

O gavião-carijó é uma ave da família Accipitridae.

É comum vê-lo voando em casais, em movimentos circulares sobre as RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Possui o hábito de utilizar o mesmo poleiro de caça por longo tempo.

Alimenta-se de insetos, aves, lagartos e morcegos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-carijo>

Gavião-de-rabo-branco

[Retorne ao Índice](#)

Geranoaetus albicaudatus



Foto (morfo escuro): **Silvia Faustino Linhares**

O gavião-de-rabo-branco é uma ave pertencente à família Accipitridae.

Costuma pairar com as asas imóveis, movendo apenas as primárias e a cauda para manter o voo.

É comum ser visto voando nas proximidades das RPPNs e Reserva Legal, objetos deste estudo.

Alimenta-se de insetos, répteis, mamíferos, anfíbios e até de outras aves de menor porte.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-de-rabo-branco>

Águia-serrana

[Retorne ao Índice](#)

Geranoaetus melanoleucus



Foto (jovem): Silvia Faustino Linhares

A águia-serrana é uma ave da família Accipitridae.

Costuma ser vista em áreas abertas, campos e regiões montanhosas, planando por muito tempo nessas regiões à procura de alimento.

Com um voo poderoso e veloz, caça outras aves, cobras e mamíferos pequenos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/aguia-serrana>

Carão

Aramus guarauna

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O carão é uma ave pertencente à família Aramidae.

É encontrado na várzea da Reserva Legal Pousada dos Tucanos. Costuma ser visto solitário.

Alimenta-se de grandes caramujos aquáticos, podendo comer, ainda, caramujos terrestres e pequenos lagartos, entre outros.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/carao>

Saracura-do-mato

[Retorne ao Índice](#)

Aramides saracura



Foto: Ferrão

A saracura-do-mato é uma ave da família Rallidae. Bastante arisca. É escutada sua vocalização, com frequência, na várzea do Sítio São Dimas, como também na da Reserva Legal Pousada dos Tucanos. Alimenta-se de ovos de pererecas, pequenos anfíbios e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-do-mato>

Saracura-sanã

Pardirallus nigricans

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

A saracura-sanã pertence à família Rallidae.

É encontrada entre a vegetação fechada das florestas da Reserva Legal Pousada dos Tucanos e das RPPNs São Francisco de Assis, Instituto Olho D'Água e Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de pequenos anfíbios, insetos, brotos, capins, larvas em brejos e beiras de lagos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-sana>

Galinha-d'água

Gallinula galeata

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A galinha-d'água, também conhecida por frango-d'água-comum, é uma ave da família Rallidae.

Ave aquática das mais comuns do Brasil, ela caminha sobre a vegetação mais densa, comendo brotos e caçando artrópodes e pequenos vertebrados.

É encontrada em lagos e no braço da represa de Furnas que banha o município de Alterosa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

http://www.wikiaves.com.br/wiki/frango-d_agua-comum

Quero-quero *Vanellus chilensis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Mario Olyntho

O quero-quero é uma ave da família Charadriidae.

Bastante comum nos pastos existentes nas propriedades rurais de Alterosa, inclusive é frequentemente visto no campo de futebol do Cavacos.

Sua vocalização deu origem a seu nome onomatopéico “quero-quero”. Alimenta-se de invertebrados aquáticos, pequenos peixes e, ainda, de artrópodes e moluscos terrestres.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/quero-quero>

Pernilongo-de-costas-brancas

[Retorne ao Índice](#)

Himantopus melanurus



Foto: Silvia Faustino Linhares

O pernilongo-de-costas-brancas é uma ave da família Recurvirostridae. É vista no braço da represa de Furnas que separa os municípios de Alterosa e Areado.

Alimenta-se de insetos e pequenas presas com seu bico afilado.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pernilongo-de-costas-brancas>

Maçarico-de-colete

[Retorne ao Índice](#)

Calidris melanotos



Foto: Ferrão

O maçarico-de-colete é uma ave da família Scolopacidae.

Ave migratória visitante do Hemisfério Norte, pode ser encontrada nos meses quentes, no braço da represa de Furnas que separa os municípios de Alterosa e Areado.

Alimenta-se de animalejos de locomoção lenta, que captura usando predominantemente o bico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/macarico-de-colete>

Jaçanã

Jacana jacana

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

O jaçanã é uma ave pertencente à família Jacanidae.

Possui o hábito de ficar nos brejos e margens de rios. É encontrada em lagos e no braço da represa de Furnas que banha o município de Alterosa.

Alimenta-se de plantas, insetos e outros invertebrados que encontra nas margens de cursos d'água.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/jacana>

Rolinha-roxa

[Retorne ao Índice](#)

Columbina talpacoti



Foto (macho): Luiz Bravo

A rolinha-roxa, conhecida como rolinha-caldo-de-feijão, é uma ave pertencente à família Columbidae.

Pomba mais comum no Brasil, muito presente em todo o município de Alterosa, tanto na área urbana como na área rural.

Alimenta-se de grãos encontrados no chão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-roxa>

Rolinha-fogo-apagou

Columbina squammata

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A rolinha-fogo-apagou, também conhecida somente por fogo-apagou, é uma ave da família Columbidae.

Possui o hábito discreto, anda em casais ou pequenos grupos. É vista próximo ao curral do Sítio São Dimas e no Sítio Videira, onde se encontra a RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Sua vocalização lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “fogo-apagou”. Alimenta-se no chão, andando com a barriga quase arrastando no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/fogo-apagou>

Pombo-doméstico

[Retorne ao Índice](#)

Columba livia



Foto: Luciano Monferrari

O pombo-doméstico é uma espécie originária da Eurásia e África, introduzida no Brasil no início da colonização portuguesa, pertencente à família Columbidae. Adaptou-se perfeitamente à vida nas cidades e em todos os continentes, com exceção da Antártica.

As fezes desse animal podem transmitir muitas doenças ao homem, como histoplasmose, salmonelose, criptococose, toxoplasmose, entre muitas outras.

Alimenta-se de restos de alimentos, sementes e frutos. Somente é encontrada na área urbana do município, como na área urbana de Cavacos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pombo-domestico>

Pomba-asa-branca

Patagioenas picazuro

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

A pomba-asa-branca é uma ave da família Columbidae.

Frequentemente pode ser encontrada em toda a área rural do município de Alterosa, inclusive nas bordas das RPPNs e também na área urbanizada.

Foi referenciada na famosa música “Asa Branca” do Luiz Gonzaga. Alimenta-se de sementes e pequenos frutos geralmente coletados no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pomba-asa-branca>

Avoante

Zenaida auriculata

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

A avoante, conhecida como pomba-de-bando, é uma ave pertencente à família Columbidae.

Alimenta-se de grãos silvestres e de brotos de plantações.

Costuma ser vista, em grupos, em todo o município de Alterosa, como no Distrito do Divino Espírito Santo (Cavacos).

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/avoante>

Juriti-pupu

Leptotila verreauxi

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

A juriti-pupu ou juriti é uma ave pertencente à família Columbidae.

Podemos encontrá-la nas Reservas (RPPNs e RL) e também em toda a área rural de Cavacos e no município de Alterosa.

É granívora e frugívora. Alimenta-se de grãos, sementes, frutas e vegetais.

Ave arisca. Quando perturbada, foge caminhando sem fazer barulho ou voa, emitindo um som com as asas, até uma árvore próxima.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/juriti-pupu>

Alma-de-gato

Piaya cayana

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Emerson Kaseker

A alma-de-gato é uma ave da família Cuculidae. Possuidora de uma enorme cauda, que fica levemente caída durante o voo.

Sua alimentação é composta basicamente de insetos.

Costuma ser vista nas matas das RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/alma-de-gato>

Anu-preto

Crotophaga ani

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Sílvia Faustino Linhares

O anu-preto é uma ave pertencente à família Cuculidae.

É um animal carnívoro, alimenta-se de gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes, entre outros artrópodes.

Encontrado frequentemente nas proximidades da Reserva Legal Pousada dos Tucanos e da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-preto>

Anu-branco

[Retorne ao Índice](#)

Guira guira



Foto: Mario Olyntho

O anu-branco é uma ave da família Cuculidae, possuidor de uma longa cauda.

Alimenta-se de gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes, peixes, lagartas, lagartixas, camundongos, rãs, sapos e filhotes de aves.

Costuma ser visto em grupo nas proximidades das RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-branco>

Saci

Tapera naevia

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

O saci é uma ave pertencente à família Cuculidae.

Vive solitário, ocupando as áreas rurais do município de Alterosa. Não é fácil observá-lo, porém é normal escutar sua vocalização.

Alimenta-se de insetos adultos e lagartas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/saci>

Suindara

Tyto furcata

[Retorne ao Índice](#)



Foto (casal): Ferrão

A suindara, também conhecida como coruja-da-igreja, é uma ave pertencente à família Tytonidae.

Animal de hábitos noturnos, é possuidor de garras poderosas. Encontrada no sótão da Capela São Francisco de Assis localizada no Sítio Videira.

Ave caçadora que se alimenta de insetos, roedores, morcegos, pequenos marsupiais, anfíbios, répteis e outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/suindara>

Corujinha-do-mato

Megascops choliba

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

A corujinha-do-mato é uma ave da família Strigidae.

Possui hábitos noturnos e fica quase sempre empoleirada em árvores.

Alimenta-se de grandes artrópodes, minhocas, camundongos, morcegos, rãs, entre outros animais.

É comum avistá-la nas proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/corujinha-do-mato>

Coruja-buraqueira

Athene cunicularia

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A coruja-buraqueira é uma ave da família Strigidae. Possui hábitos diurnos e noturnos, mas é ativa, principalmente durante o crepúsculo.

É uma predadora carnívora e voraz, alimenta-se de artrópodes e pequenos vertebrados.

É vista na parte de campo da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/coruja-buraqueira>

Bacurau

[Retorne ao Índice](#)

Nyctidromus albicollis



Foto: Evaldo Cesari

O bacurau é uma ave da família Caprimulgidae, conhecido por curiangó. Animal com hábito noturno.

Alimenta-se de vários tipos de insetos, como besouros, mariposas, borboletas, abelhas, vespas e formigas, os quais são capturados em voos curtos.

Foi vista algumas vezes na RPPN São Francisco de Assis, porém há relatos desse animal espalhado em todo município de Alterosa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau>

Andorinhão-do-temporal

[Retorne ao Índice](#)

Chaetura meridionalis



Foto: Jarbas Mattos

O andorinhão-do-temporal é uma ave pertencente à família Apodidae. É visto em bandos em determinada época do ano sobrevoando as RPPNs de Alterosa.

Alimenta-se de pequenos insetos durante o voo acrobático.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinhao-do-temporal>

Rabo-branco-acanelado

[Retorne ao Índice](#)

Phaethornis pretrei



Foto: Silvia Faustino Linhares

O beija-flor rabo-branco-acanelado é uma ave pertence à família Trochilidae. É visto polinizando as flores da RPPN Josepha Mendes Ferrão e arredores. Alimenta-se principalmente de carboidratos, conseguido através do néctar das flores, mas também ingere pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/rabo-branco-acanelado>

Beija-flor-tesoura

Eupetomena macroura

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

O beija-flor-tesoura, ave pertencente à família Trochilidae.

Abundante na região das RPPNs, com um temperamento agressivo com relação às outras aves nectarívoras que adentram em seu território alimentar.

A beleza dessa ave com suas cores cintilantes, somada à sua capacidade de pairar no ar, é incrível, pois desafia a gravidade.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura>

Beija-flor-de-orelha-violeta

[Retorne ao Índice](#)

Colibri serrirostris



Foto (macho): Cárin Duarte

O beija-flor-de-orelha-violeta é uma ave da família Trochilidae.

Vive em áreas semiabertas, bordas de floresta, capoeiras, cerrados, campos, cidades, parques e jardins. Encontrado nas bordas das 3 RPPNs em pauta, também já foi visto no interior da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se do néctar de flores e caça pequenos artrópodes em voo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-orelha-violeta>

Besourinho-de-bico-vermelho

[Retorne ao Índice](#)

Chlorostilbon lucidus



Foto (fêmea): Ferrão

O besourinho-de-bico-vermelho é uma ave da família Trochilidae.

Vive em jardins e quintais floridos, capoeiras ralas, áreas abertas e matas de candeias floridas. Encontrado no Sítio Videira e nas bordas das 3 RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Alimenta-se quase que exclusivamente em voo e é adaptado para sugar o néctar das flores. Também come insetos e aranhas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/besourinho-de-bico-vermelho>

Beija-flor-tesoura-verde

[Retorne ao Índice](#)

Thalurania furcata



Foto (macho jovem): Cárin Duarte

O beija-flor-tesoura-verde é uma ave da família Trochilidae.

É comum vê-lo polinizando as flores existentes no jardim da Capela São Francisco de Assis no Sítio Videira.

Alimenta-se em flores a pouca altura, buscando também insetos na vegetação ou capturando-os no ar.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura-verde>

Beija-flor-de-fronte-violeta

[Retorne ao Índice](#)

Thalurania glaucopis



Foto (macho): Emerson Kaseker

O beija-flor-de-fronte-violeta é uma ave da família Trochilidae.

Ave que frequenta as flores das Reserva Legal Pousada dos Tucanos e as RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Alimenta-se de néctar, fura o tufo de flor do lado de fora. Também caça insetos e pequenas aranhas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-fronte-violeta>

Beija-flor-de-peito-azul

Amazilia lactea

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Emerson Kaseker

O beija-flor-de-peito-azul é uma ave da família Trochilidae.

Uma pequena ave com aproximadamente 9 cm, comum na região das RPPNs. Porém, também é encontrada em área urbana, como no jardim da Praça do Cavacos e nas Praças de Alterosa.

Alimenta-se de néctar e pequenos insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-peito-azul>

Martim-pescador-verde

[Retorne ao Índice](#)

Chloroceryle amazona



Foto (macho): Silvia Faustino Linhares

O martim-pescador-verde é uma ave pertencente à família Alcedinidae.

Frequentemente é visto empoleirado em árvores localizadas nas margens do lago vizinho à RPPN Instituto Olho D'Água e também nas árvores do “Lago do Amor” existente na RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se principalmente de peixes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/martim-pescador-verde>

Ariramba-de-cauda-ruiva

[Retorne ao Índice](#)

Galbula ruficauda



Foto (macho): Ferrão

A ariramba-de-cauda-ruiva é uma ave pertencente à família Galbulidae.

Vive em casais. É vista com frequência nas RPPNs Instituto Olho D'Água e São Francisco de Assis, onde é comum encontrar buracos estreitos e compridos nos pequenos barrancos, cavados pela ariramba-de-cauda-ruiva.

Caça exclusivamente insetos em voo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/ariramba-de-cauda-ruiva>

João-bobo

Nystalus chacuru

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

O João-bobo é uma ave pertencente à família Bucconidae.

Habita bordas de matas e é encontrado nas beiras das estradas na área rural de Alterosa.

É uma ave oportunista, alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados, como lagartos e pererecas. Apanha suas presas esperando por sua passagem a partir de um poleiro nas galhadas da borda da mata.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/joao-bobo>

Tucanuçu

Ramphastos toco

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O tucanuçu é o maior dos tucanos, ave da família Ramphastidae.

Vive aos pares ou em bandos que voam em fila. Essa espécie foi a que motivou o casal Dinêila e Fábio Ferrão a colocar o nome da Reserva Legal de “Pousada dos Tucanos”, considerando o avistamento de dezenas deles pousando sobre as árvores da Reserva Legal em um determinado dia, emocionando o casal pesquisador.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tucanucu>

Picapauzinho-barrado

[Retorne ao Índice](#)

Picumnus cirratus



Foto (macho): Constantino Melo

O picapauzinho-barrado, também conhecido como pica-pau-anão-barrado, é uma ave pertencente à família Picidae.

É comum avistá-lo no interior e bordas de florestas altas e capoeiras de Alterosa. É encontrado nas Reservas objeto do presente estudo, entre suas vegetações.

Alimenta-se de larvas e adultos de pequenos insetos. Ave pequena e graciosa, medindo aproximadamente 10 cm.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-anao-barrado>

Pica-pau-branco

Melanerpes candidus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O pica-pau-branco, conhecido por birro, pertence à família Picidae. Costuma ser visto entre os galhos das árvores existentes na floresta da RPPN Josepha Mendes Ferrão e da RPPN São Francisco de Assis. Alimenta-se de insetos, larvas, sementes, frutos e mel.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-branco>

Pica-pau-pequeno

Veniliornis passerinus

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Jarbas Mattos

O pica-pau-pequeno, também conhecido como picapauzinho-anão, é uma ave pertencente à família Picidae.

Vive em áreas abertas e bordas de matas. É encontrado nas bordas das RPPNs São Francisco de Assis, Instituto Olho D'Água e Josepha Mendes Ferrão, bem como, na Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos entre outros artópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/picapauzinho-anao>

Pica-pau-verde-barrado

[Retorne ao Índice](#)

Colaptes melanochloros



Foto (macho): Luiz Bravo

O pica-pau-verde-barrado, é uma ave pertencente à família Picidae. Ave imponente com hábitos em paisagens abertas.

Visto com frequência nas árvores que margeiam a RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de formigas, cupins, entre outros artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-verde-barrado>

Pica-pau-do-campo

Colaptes campestris

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Ferrão

O pica-pau-do-campo, também conhecido como chã-chã, é um grande pica-pau sul-americano, campestre e terrícola, pertencente à família Picidae.

Vive em pequenos bandos, pousando com frequência no solo. É comum encontrá-lo nos pastos da área rural de Alterosa. Também são encontrados alguns indivíduos grudados, no período noturno, na parede da Capela São Francisco de Assis, no Sítio Videira.

Alimenta-se de insetos, principalmente formigas e cupins.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-do-campo>

Pica-pau-de-cabeça-amarela

Celeus flavescens

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Luiz Bravo

O pica-pau-de-cabeça-amarela, conhecido como João-velho.

Ave muito bonita da família Picidae.

Costuma ser visto entre árvores existentes nas RPPNs e Reserva Legal, Unidades de Conservação objetos do presente estudo.

Alimenta-se de insetos, suas larvas e ovos, formigas e cupins — nas árvores ou no solo — e de uma grande variedade de frutas e bagas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-cabeça-amarela>

Pica-pau-de-banda-branca

[Retorne ao Índice](#)

Dryocopus lineatus



Foto (macho): Silvia Faustino Linhares

O pica-pau-de-banda-branca é uma ave pertencente à família Picidae. Sua vocalização é ouvida nas matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Possui uma beleza singular e um tamanho avantajado de 35 cm. Alimenta-se de insetos, larvas, sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-banda-branca>

Seriema

[Retorne ao Índice](#)

Cariama cristata



Foto: Ferrão

A seriema é uma ave pertencente à família Cariamidae.

Possui o costume de andar pelo chão, aos pares ou em pequenos bandos. Se perseguida, foge correndo, deixando para voar somente se sentir perigo. Muito comum escutar e visualizar a seriema nos pastos que ficam ao redor das RPPNs e também no interior da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se desde insetos até pequenos vertebrados, como roedores e pequenos répteis.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/seriema>

Carcará

Caracara plancus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O carcará é uma ave pertencente à família Falconidae.

É visto tanto sozinho como em bandos, em redor de carcaças. Vive em comensalismo com os urubus. Sobrevoa as RPPNs e todo o município de Alterosa, inclusive nas áreas urbanas à procura de alimento.

Alimenta-se de quase tudo, animais vivos ou mortos e até de lixo.

Essa ave foi referenciada na famosa canção “Carcará”, composta por João do Valle e José Cândido, interpretada pela Maria Bethânia.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/carcara>

Carrapateiro

Milvago chimachima

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Cárin Duarte

O carrapateiro é uma ave pertencente à família Falconidae.

É um dos gaviões mais conhecidos no Brasil. Costuma ser observado sobrevoando as RPPNs e próximo aos gados espalhados nos pastos existentes na área rural do município de Alterosa.

Alimenta-se de carrapatos, lagartas, cupins, frutas, entre outras opções. Além disso, saqueia ninhos de outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/carrapateiro>

Quiriquiri

Falco sparverius

[Retorne ao Índice](#)



Foto (jovem): Silvia Faustino Linhares

O quiriquiri é uma ave pertencente à família Falconidae.

Ocupa áreas semiurbanizadas, margens de estradas e ambientes abertos. Não é comum avistá-lo em Alterosa, porém já foi encontrado nas margens da rodovia.

Alimenta-se de lagartos e grandes insetos, apreciando também, roedores, pequenas cobras, morcegos e pequenas aves. Possui o costume de apanhar sua caça em voo de baixa altura.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/quiriquiri>

Maracanã

[Retorne ao Índice](#)

Primolius maracana



Foto: Flavio Guglielmino

A maracanã, também conhecida como maracanã-verdadeira, é uma ave pertencente à família Psittacidae, grupo das aves mais inteligentes.

Habita beiras das matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos, em grupos barulhentos.

Alimenta-se de frutos, principalmente de palmeira.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/maracana-verdadeira>

Periquitão

[Retorne ao Índice](#)

Psittacara leucophthalmus



Foto: Maria Albers

O periquitão é conhecido também por periquitão-maracanã, pertence à família Psittacidae.

Vive em grupos barulhentos, que frequentam a região onde ficam as Unidades de Conservação objetos do presente estudo (RPPNs e RL). Também utilizam o sótão da Capela São Francisco de Assis, no Sítio Videira, para a nidificação (construção de ninho).

Sua alimentação consiste, principalmente, de frutos e sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquitao-maracana>

Jandaia-de-testa-vermelha

[Retorne ao Índice](#)

Aratinga auricapillus



Foto: Jarbas Mattos

A jandaia-de-testa-vermelha, também conhecida como jandaia-mineira, é uma ave da família Psittacidae.

Vive em bandos grandes e muito barulhentos. Frequentam a região das RPPNs de Alterosa no Cavacos.

Alimenta-se de sementes, castanhas e frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/jandaia-de-testa-vermelha>

Periquito-rei *Eupsittula aurea*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Sílvia Faustino Linhares

O periquito-rei é uma ave pertencente à família Psittacidae. Conhecida na região pelo nome de coquinho.

Vive em casal, que permanece unido por toda a vida. Encontrado aos arredores das RPPNs Josepha Mendes Ferrão, Instituto Olho D'Água e São Francisco de Assis.

Alimenta-se de frutas, castanhas e sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquito-rei>

Tuim

[Retorne ao Índice](#)

Forpus xanthopterygius



Foto (macho): Cárin Duarte

O tuim é um dos menores representantes da família Psittacidae. Encontrado na região das RPPNs de Alterosa no Cavacos.

Sua cor verde se confunde com as folhas das árvores, fazendo-o passar despercebido no ambiente. Somente o som de sua vocalização denuncia sua presença.

Alimenta-se de frutos, sementes e brotos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuim>

Periquito-de-encontro-amarelo

[Retorne ao Índice](#)

Brotogeris chiriri



Foto: Emerson Kaseker

O periquito-de-encontro-amarelo é uma ave pertencente à família Psittacidae. Vive em campos de vegetação baixa e matas ciliares. Costuma frequentar a RPPN Josepha Mendes Ferrão, na mata ciliar do regato São Francisco, local onde se encontra o Lago do Amor.

Adaptou-se aos ambientes urbanos, podendo ser encontrado em grupos, no Cavacos e Alterosa.

Alimenta-se de frutos, sementes, flores e néctar.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquito-de-encontro-amarelo>

Papagaio-verdadeiro

[Retorne ao Índice](#)

Amazona aestiva



Foto: Jarbas Mattos

O papagaio-verdadeiro é uma ave inteligente da família Psittacidae.

É comum encontrá-lo pelas manhãs, cruzando o céu sobre as RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Costuma viver em casal e voam tão juntos que parecem ser uma grande ave de quatro asas.

Alimenta-se de sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/papagaio-verdadeiro>

Choquinha-lisa

[Retorne ao Índice](#)

Dysithamnus mentalis



Foto (macho): Jarbas Mattos

A choquinha-lisa é uma ave da família *Thamnophilidae*.

É encontrada próximo ao dossel das florestas das RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Vive geralmente aos pares, pulando vagarosamente em busca de pequenos insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/choquinha-lisa>

Choca-barrada

[Retorne ao Índice](#)

Thamnophilus doliatus



Foto (macho): Caroline Avelar

A choca-barrada é uma ave pertencente à família Thamnophilidae. Frequentadora da RPPN Josepha Mendes Ferrão, Sítio Videira e Sítio São Dimas. Também é encontrada em outras regiões do Cavacos e Alterosa. Alimenta-se de artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/choca-barrada>

Choca-da-mata

[Retorne ao Índice](#)

Thamnophilus caerulescens



Foto (macho): Silvia Faustino Linhares

A choca-da-mata é uma ave da família Thamnophilidae.

É comum encontrá-la, geralmente aos casais, nos estratos médios e inferior da floresta que compreende as RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Alimenta-se de insetos, mas também pode incluir pequenos frutos em sua dieta.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/choca-da-mata>

Chupa-dente

[Retorne ao Índice](#)

Conopophaga lineata



Foto (fêmea): Luiz Bravo

O chupa-dente é uma ave pertencente à família Conopophagidae.

Vive solitário ou em casais. Forrageia próximo ao solo à procura de insetos, aracnídeos e outros artrópodes.

Costuma ser visto na mata ciliar do Regato São Francisco no interior da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/chupa-dente>

Arapaçu-rajado

Xiphorhynchus fuscus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Jarbas Mattos

O arapaçu-rajado é uma ave da família Dendrocolaptidae.

Possui o *habitat* no estrato médio denso de matas primárias ou secundárias tardias. É visto na floresta que compreende as RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água. Possui o hábito de subir pelos troncos das árvores.

Alimenta-se de artrópodes em geral: lacraias, centopeias, moscas, aranhas e até escorpiões.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-rajado>

Arapaçu-de-cerrado

[Retorne ao Índice](#)

Lepidocolaptes angustirostris



Foto: Silvia Faustino Linhares

O arapaçu-de-cerrado é uma ave da família Dendrocolaptidae.

Possui o hábito de subir pelos troncos das árvores. É visto com frequência nas árvores da RPPN Josepha Mendes Ferrão e RL Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos, além de aranhas, escorpiões, pererecas, girinos e lagartixas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-de-cerrado>

Arapaçu-grande

[Retorne ao Índice](#)

Dendrocolaptes platyrostris



Foto: Luiz Bravo

O arapaçu-grande é uma ave da família Dendrocolaptidae.

É o maior dos arapaçus, medindo aproximadamente 27 centímetros de comprimento. Encontrados nas RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos, além de aranhas, escorpiões, pererecas, girinos, lagartixas, entre outros pequenos animais.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-grande>

Bico-virado-carijó

Xenops rutilans

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

O bico-virado-carijó é uma ave pertencente à família Xenopidae.

É visto no interior das florestas que compreendem as RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Alimenta-se de insetos, formigas, aranhas e pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-virado-carijo>

Casaca-de-couro-da-lama

[Retorne ao Índice](#)

Furnarius figulus



Foto: Silvia Faustino Linhares

O casaca-de-couro-da-lama é uma ave da família Furnariidae.

Vive em matas ribeirinhas, babaçuais, brejos e áreas úmidas. É encontrado na mata ciliar do regato São Francisco na RPPN Josepha Mendes Ferrão, como também na várzea da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos, suas larvas e pequenos peixes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/casaca-de-couro-da-lama>

João-de-barro

Furnarius rufus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O João-de-barro é famoso pelo seu ninho em formato de forno, muito bem estruturado. Pertencente à família Furnariidae.

É visto com seu andar elegante, revirando a gramínea à procura de alimento no pasto ao redor da Capela São Francisco de Assis no Sítio Videira.

Bastante comum em todo o município de Alterosa.

Alimenta-se de frutas, cupins, formigas, minhocas e restos alimentares humanos, como pedaços de pão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-de-barro>

João-de-pau

Phacellodomus rufifrons

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O João-de-pau é uma ave da família Furnariidae.

Habita campos com arbustos e árvores esparsas. É encontrado nas proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares.

Alimenta-se de insetos obtidos na vegetação arbórea ou no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-de-pau>

João-botina-do-brejo

Phacellodomus ferrugineigula

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

O João-botina-do-brejo é uma ave da família Furnariidae.

Habita matas úmidas em brejos e restingas pantanosas. É encontrado na Reserva Legal Pousada dos Tucanos, na várzea do Sítio São Dimas e na RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de artrópodes e suas larvas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-botina-do-brejo>

Curutié

[Retorne ao Índice](#)

Certhiaxis cinnamomeus



Foto: Silvia Faustino Linhares

O curutié é uma ave pertencente à família Furnariidae.

Encontrado nas vegetações das varzeas da Reserva Legal Pousada dos Tucanos e nas RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Alimenta-se de insetos, aranhas, opiliões e outros artrópodes e moluscos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/curutie>

João-teneném

Synallaxis spixi

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Jarbas Mattos

O João-teneném é uma ave pertencente à família Furnariidae.

É encontrado pulando em meio à vegetação mais densa das RPPNs e Reserva Legal, objetos do presente estudo.

Alimenta-se de artrópodes. Possui o costume de procurar alimento nos ramos baixos e ocasionalmente no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-tenenem>

Bico-chato-de-orelha-preta

[Retorne ao Índice](#)

Tolmomyias sulphurescens



Foto: Sílvia Faustino Linhares

O bico-chato-de-orelha-preta, ou simplesmente bico-chato, é uma ave da família Rhynchocyclidae.

Sua vocalização lembra o som de um apito de juiz.

Alimenta-se de insetos presentes entre as folhagens e ramos da vegetação existente na RPPN Josepha Mendes Ferrão e arredores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-chato-de-orelha-preta>

Teque-teque

[Retorne ao Índice](#)

Todirostrum poliocephalum



Foto: Luciano Monferrari

O teque-teque é uma ave pertencente à família Rhynchocyclidae.

Ave pequena e muito agitada, quase nunca fica imóvel.

É visto em árvores na RPPN Josepha Mendes Ferrão e também, com bastante frequência, no Sítio São Dimas, propriedade em frente a essa reserva.

Alimenta-se de pequenos frutos e captura insetos em pleno ar.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/teque-teque>

Ferreirinho-relógio

Todirostrum cinereum

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

O ferreirinho-relógio é uma ave pertencente à família Rhynchocyclidae.

Vive escondido no meio da vegetação baixa e apresenta o comportamento característico de movimentar a cauda lateralmente. Ave pequena, com apenas 8 cm de tamanho.

É encontrado em vários locais, inclusive na RPPN Josepha Mendes Ferrão. Alimenta-se de artrópodes, caçando no meio das folhagens das árvores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/ferreirinho-relogio>

Gibão-de-couro

Hirundinea ferruginea

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Jarbas Mattos

O gibão-de-couro é uma ave da família Tyrannidae.

É visto em pequenos grupos frequentando a cidade de Alterosa, próximo às praças.

Alimenta-se caçando insetos no ar por meio de manobras acrobáticas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/gibao-de-couro>

Guaracava-de-barriga-amarela

[Retorne ao Índice](#)

Elaenia flavogaster



Foto: Flavio Guglielmino

A guaracava-de-barriga-amarela é uma ave da família Tyrannidae.

Vive em casais ou pequenos grupos familiares. É vista no Cavacos e nas proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se principalmente de pequenos frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/guaracava-de-barriga-amarela>

Alegrinho

[Retorne ao Índice](#)

Serpophaga subcristata



Foto: Luiz Bravo

O alegrinho é uma ave pertencente à família Tyrannidae.

É encontrado na RPPN Josepha Mendes Ferrão, deslocando-se sobre as árvores. Também é encontrado na Reserva Legal Pousada dos Tucanos e em seus arredores.

Alimenta-se de insetos capturados nas árvores, folhagens e até no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/alegrinho>

Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

[Retorne ao Índice](#)

Myiarchus tyrannulus



Foto: Silvia Faustino Linhares

A maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado é uma ave da família Tyrannidae. É encontrada nas três RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água e também na Reserva Legal Pousada dos Tucanos. Alimenta-se de insetos e suas larvas, bem como, de frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado>

Bem-te-vi

[Retorne ao Índice](#)

Pitangus sulphuratus



Foto: Ferrão

O bem-te-vi é uma ave pertencente à família dos Tiranídeos.

Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopéico “bem-te-vi”.

Ave agressiva, ameaça outras aves quando essas se aproximam de seu território. Bastante comum em todo o município de Alterosa e nas proximidades das Unidades de Conservação do presente estudo.

Alimenta-se de artrópodes, pequenos vertebrados e frutos.

Curiosidade: essa ave foi referenciada na canção “Bem-te-vi” de Renato Terra, no início da década de 80.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi>

Suiriri-cavaleiro

Machetornis rixosa

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O suiriri-cavaleiro é uma ave pertencente à família Tyrannidae.

Possui o hábito de passar a maior parte do tempo no solo, andando à procura de insetos próximo ao gado e cavalos existentes nos pastos ao redor das RPPNs e da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

É comum encontrá-lo sobre o telhado da Capela São Francisco de Assis, no Sítio Videira.

Alimenta-se de artrópodes, preferencialmente insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-cavaleiro>

Bem-te-vi-rajado

[Retorne ao Índice](#)

Myiodynastes maculatus



Foto: Ferrão

O bem-te-vi-rajado pertence à família Tyrannidae.

Vive em casais e habita as bordas das florestas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos que apanha em voos, além de pequenos frutos, sendo um dispersor de sementes pela região.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi-rajado>

Neinei

[Retorne ao Índice](#)

Megarynchus pitangua



Foto: Emerson Kaseker

O neinei é uma ave da família dos Tiranídeos.

É comum escutar sua vocalização característica e onomatopeica, a qual deu origem ao seu nome “neinei”, nas proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de insetos, frutas, pequenos peixes, pequenos lagartos e filhotes de outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/neinei>

Bentevizinho-de-penacho-vermelho

[Retorne ao Índice](#)

Myiozetetes similis



Foto: Ferrão

O bentevizinho-de-penacho-vermelho, também conhecido como bem-te-vizinho, pertence à família Tyrannidae.

A vocalização dessa ave é ouvida nas bordas da mata da RPPN Josepha Mendes Ferrão e seus arredores.

Alimenta-se de insetos, capturados durante pequenos voos e, ainda, de pequenas frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bentevizinho-de-penacho-vermelho>

Suiriri-de-garganta-branca

Tyrannus albogularis

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O suiriri-de-garganta-branca é uma ave da família Tyrannidae.

É encontrada nas bordas das três RPPNs e da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Comum em todo o Estado de Minas Gerais.

Alimenta-se de insetos e frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-de-garganta-branca>

Suiriri

[Retorne ao Índice](#)

Tyrannus melancholicus



Foto: Cárin Duarte

O suiriri é uma ave pertencente à família Tyrannidae.

É encontrado em todo o Brasil. Presente nas áreas urbanas de Alterosa e Cavacos. Também é vista nas proximidades das RPPNs e da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de artrópodes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri>

Tesourinha

Tyrannus savana

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Jarbas Mattos

A tesourinha é uma ave pertencente à família Tyrannidae. Possui uma longa cauda bifurcada. Durante o voo realiza manobras acrobáticas. Ave migratória, forma grandes bandos durante os deslocamentos. É encontrada nos meses quentes na região das Unidades de Conservação em pauta.

Alimenta-se de artrópodes e de pequenos frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tesourinha>

Filipe

[Retorne ao Índice](#)

Myiophobus fasciatus



Foto: Emerson Kaseker

O filipe é uma ave pertencente à família Tyrannidae.

Costuma ser visto nas bordas das florestas existentes nas RPPNs São Franciscos de Assis, Instituto Olho D'Água e Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de insetos alados, que apanha em voos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/filipe>

Príncipe

Pyrocephalus rubinus

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Jarbas Mattos

O príncipe é uma ave pertencente à família Tyrannidae.

Presente na região do Cavacos, próximo às RPPNs.

Além das cores, destaca-se por seu hábito de pousar em galhos expostos, mourões, cercas, postes e fios.

Alimenta-se de insetos capturados no ar ou no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/principe>

Lavadeira-mascarada

[Retorne ao Índice](#)

Fluvicola nengeta



Foto: Ferrão

A lavadeira-mascarada é uma ave pertencente à família Tyrannidae.

Costuma viver em casais, que caminham ativamente pelo solo.

É visto com frequência, próximo aos açudes do Sítio São Dimas e do Lago do Amor no interior da RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de pequenos artrópodes que captura na lama das margens de rios, regatos, lagoas e lagos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/lavadeira-mascarada>

Freirinha

[Retorne ao Índice](#)

Arundinicola leucocephala



Foto (macho): Silvia Faustino Linhares

A freirinha é uma ave pertencente à família Tyrannidae.

Encontrada na mata ciliar das RPPNs Instituto Olho D'Água e Josepha Mendes Ferrão.

Comum em brejos, banhados, margens de rios e lagos.

Alimenta-se de insetos que captura em pleno voo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/freirinha>

Tesoura-do-brejo

Gubernetes yetapa

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A tesoura-do-brejo é uma ave pertencente à família Tyrannidae.

É encontrada solitária ou em casais nas várzeas do Sítio São Dimas e da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Comum em brejos, banhados, margens de rios, regatos e lagos.

Alimenta-se de insetos e outros artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tesoura-do-brejo>

Maria-preta-de-penacho

[Retorne ao Índice](#)

Knipolegus lophotes



Foto: Silvia Faustino Linhares

A maria-preta-de-penacho é uma ave pertencente à família Tyrannidae. É encontrada solitária ou em casais nas várzeas do Sítio São Dimas e da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Comum em brejos, banhados, margens de rios, regatos e lagos.

Alimenta-se de insetos que são capturados no ar após um rápido voo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/maria-preta-de-penacho>

Suiriri-pequeno

Satrapa icterophrys

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O suiriri-pequeno é uma ave pertencente à família Tyrannidae. É encontrada nas beiras das matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Comum em brejos, banhados, margens de rios, regatos e lagos.

Alimenta-se de artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri-pequeno>

Primavera

Xolmis cinereus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Emerson Kaseker

A primavera é uma ave da família Tyrannidae.

Frequenta os pastos e as beiras das matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Na ação de caça, costuma pousar em pontos altos, utilizando postes, mourões, cercas, antenas, entre outros locais altos, de onde se lança em voos rápidos e curtos para caçar insetos em pleno voo ou no chão, voltando quase sempre ao mesmo ponto. Costuma acrescentar peixes à sua dieta.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/primavera>

Noivinha-branca

Xolmis velatus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A noivinha-branca é uma espécie migratória, típica de áreas campestres, da família Tyrannidae.

É comum encontrá-la sobre o telhado da Capela São Francisco de Assis, no Sítio Videira e, também, nos arredores das Unidades de Conservação destaques do presente estudo.

Alimenta-se principalmente de insetos e de frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/noivinha-branca>

Juruviara

Vireo chivi

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

A juruviara é uma ave migratória pertencente à família Vireonidae.

É comum encontrá-la nos fragmentos das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se principalmente de insetos e também de frutos.

Percorre as copas das árvores em busca de seu alimento, que consiste em insetos pequenos, aranhas e frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/juruviara>

Gralha-do-campo

Cyanocorax cristatellus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A gralha-do-campo é uma ave pertencente à família Corvidae.

Vivem em grupos de 4 a 8 indivíduos, bastante abundante na região onde se encontra a RPPN Josepha Mendes Ferrão e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

É um animal onívoro. Alimenta-se de frutos, insetos, sementes, bagas, pequenos répteis e outras aves e ovos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/gralha-do-campo>

Gralha-picaça

Cyanocorax chrysops

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

A gralha-picaça é uma ave da família Corvidae.

Habita as matas das RPPNs Josepha Mendes Ferrão, São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água, bem como a mata da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos, frutos e, às vezes, ovos de outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/gralha-picaca>

Andorinha-pequena-de-casa

[Retorne ao Índice](#)

Pygochelidon cyanoleuca



Foto: Emerson Kaseker

A andorinha-pequena-de-casa é uma ave da família Hirundinidae.

É muito presente no município de Alterosa, tanto nas áreas urbanas como nas rurais, pois diariamente é vista sobrevoando acrobaticamente enquanto caçam insetos sobre a RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Passam a maior parte do dia voando, pousando apenas para descansar ou quando o tempo está ruim.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-pequena-de-casa>

Andorinha-serradora

Stelgidopteryx ruficollis

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

A andorinha-serradora é uma ave pertencente à família Hirundinidae.

Vive em pequenos grupos, empoleirada em galhos mortos, morões, cercas e fios. É encontrada com maior frequência na região de Estiva, na área rural do Cavacos. Porém, também é vista na Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de cupins, formigas, moscas e até abelhas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-serradora>

Andorinha-do-campo

Progne tapera

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

A andorinha-do-campo é uma ave da família Hirundinidae.

Habita o campo e a paisagem aberta de cultura. Costuma pousar sobre fios elétricos e cercas. É encontrada voando sobre as RPPNs e a Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de cupins, formigas, moscas e até abelhas, da mesma forma que a andorinha-serradora.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-do-campo>

Andorinha-de-sobre-branco

[Retorne ao Índice](#)

Tachycineta leucorrhoa



Foto: Jarbas Mattos

A andorinha-de-sobre-branco é uma ave da família Hirundinidae.

Costuma voar baixo sobre os gramados e aparece nas margens dos rios. É encontrado nas proximidades da RPPN Josepha Mendes Ferrão e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de insetos e pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-de-sobre-branco>

Corruíra

[Retorne ao Índice](#)

Troglodytes musculus



Foto: Emerson Kaseker

A corruíra é uma ave pequenina pertencente à família Troglodytidae.

Vive solitária ou aos pares; macho e fêmea cantam em dueto. É encontrada nas bordas das matas das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de pequenos insetos que procura entre a folhagem baixa e em todo lugar escondido. Também aprecia pequenas aranhas e filhotes de lagartixa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/corruira>

Japacanim

Donacobius atricapilla

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Sílvia Faustino Linhares

O japacanim é uma ave pertencente à família Donacobiidae.

É encontrada nas várzeas da Reserva Legal Pousada dos Tucanos e arredores, onde encontra pequenos organismos para alimentar-se.

Alimenta-se de insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/japacanim>

Sabiá-barranco

Turdus leucomelas

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O sabiá-barranco é uma ave pertencente à família Turdidae.

É comum encontrá-lo nos pomares nas proximidades das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos. Canta somente na primavera, época em que acasala.

Alimenta-se basicamente de minhocas, artrópodes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-barranco>

Sabiá-laranjeira

Turdus rufiventris

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

O sabiá-laranjeira é uma ave pertencente à família Turdidae.

Ave símbolo do Dia Nacional das Aves. É encontrada nas bordas das matas das Unidades de Conservação do presente estudo, com sua vocalização típica.

Alimenta-se de insetos, larvas, minhocas e frutas maduras, incluindo frutas cultivadas como o mamão, a laranja e o abacate sendo, portanto, uma ave dispersora de sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/sabia-laranjeira>

Sabiá-poca

[Retorne ao Índice](#)

Turdus amaurochalinus



Foto: Silvia Faustino Linhares

O sabiá-poca é uma ave pertencente à família Turdidae.

Visto em bordas das matas ciliares das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos e nos arredores. Só canta na época de reprodução.

Alimenta-se de invertebrados e pequenos frutos, principalmente no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-poca>

Sabiá-do-campo

Mimus saturninus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

O sabiá-do-campo é pertencente à família Mimidae.

É uma ave famosa por seu repertório de cantos, que imitam outras espécies de aves.

Vive em grupos familiares e é encontrado frequentando as RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se principalmente de invertebrados e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-do-campo>

Tico-tico

Zonotrichia capensis

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O tico-tico é uma ave pertencente à família Passerellidae.

É um dos pássaros mais conhecidos e estimados do Brasil.

A canção “Tico-tico no Fubá” composta em 1917 por Zequinha de Abreu, é um chorinho de fama internacional que homenageia esta ave.

Ele é encontrado em todo município de Alterosa, tanto na área urbana como na rural e nas proximidades das RPPNs.

Alimenta-se de sementes, brotos, frutas e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico>

Tico-tico-do-campo

Ammodramus humeralis

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Emerson Kaseker

O tico-tico-do-campo é uma ave pertencente à família Passerellidae.

Vive em campos secos com gramíneas, porém é visto entre as vegetações das bordas das RPPNs São Francisco de Assis e Instituto Olho D'Água.

Alimenta-se basicamente de sementes, mas também apanha pequenos insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico-do-campo>

Pula-pula

[Retorne ao Índice](#)

Basileuterus culicivorus



Foto: Jarbas Mattos

O pula-pula é pertencente à família Parulidae.

É uma ave bastante inquieta, daí seu nome popular de pula-pula.

Vive no interior de florestas, encontrado nas RPPNs São Francisco de Assis, Instituto Olho D'Água e Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de insetos capturados na superfície de ramos e folhas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pula-pula>

Japu

Psarocolius decumanus

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Emerson Kaseker

O japu é uma ave pertencente à família Icteridae.

É bastante comum encontrar grupos de japu utilizando a RPPN Josepha Mendes Ferrão e seus arredores. Também é visto em bandos misturados com outras espécies de aves, como as gralhas.

Alimenta-se de frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/japu>

Encontro

[Retorne ao Índice](#)

Icterus pyrrhopterus



Foto: Silvia Faustino Linhares

O encontro é uma ave pertencente à família Icteridae.

Comum avistá-lo nos ambientes florestados. Vive solitário, aos pares e, eventualmente, em bandos mistos.

Frequentador assíduo das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de invertebrados, frutos e flores. Também, suga o néctar das flores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/encontro>

Pássaro-preto

Gnorimopsar chopi

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

O pássaro-preto, também conhecido como graúna, é uma ave da família Icteridae.

É comum em áreas agrícolas.

Vive normalmente em pequenos grupos que fazem bastante barulho. Pousa no chão ou em árvores sombreadas. Muito comum na região da Estiva, área rural de Cavacos.

Alimenta-se de frutos, sementes, insetos, aranhas e outros invertebrados.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/grauna>

Garibaldi

[Retorne ao Índice](#)

Chrysomus ruficapillus



Foto (macho): Luiz Bravo

O garibaldi é uma ave pertencente à família Icteridae.

Vive nas paisagens úmidas, banhados, brejos e várzeas, em bandos numerosos.

É encontrado na Reserva Legal Pousada dos Tucanos e também nas RPPNs Instituto Olho D'Água e Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de frutas, sementes, grãos e pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/garibaldi>

Chupim-do-brejo

Pseudoleistes guirahuro

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Cárin Duarte

O chupim-do-brejo, também conhecido na região pelo nome de pássaro-preto-soldado ou somente soldado, é uma ave pertencente à família Icteridae.

Vivem nos brejos, nas várzeas com capim alto, quase sempre em bandos.

É encontrado nas várzeas existentes na Reserva Legal Pousada dos Tucanos e seus arredores.

Alimenta-se de grãos e sementes que encontra nos brejos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/chupim-do-brejo>

Chupim

Molothrus bonariensis

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Cárin Duarte

O chupim é uma ave pertencente à família Icteridae.

Vocaliza em voo e é muito conhecida por seu comportamento de parasitar ninhos de outras espécies de aves como, por exemplo, o do tico-tico. Nesses momentos, ele bota seus ovos no ninho do tico-tico, enganando-o e estimulando-o a criar os tais filhotes como se fossem dele.

É comum encontrá-lo em todo o município de Alterosa.

Alimenta-se de insetos, sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/chupim>

Polícia-inglesa-do-sul

Sturnella superciliaris

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Cárin Duarte

O polícia-inglesa-do-sul é uma ave pertencente à família Icteridae. Vive em zonas úmidas. É visto com mais frequência nas margens do braço da represa de Furnas, que divide o município de Alterosa com Areado. Alimenta-se de larvas, insetos e várias sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/policia-inglesa-do-sul>

Cardeal-do-nordeste

[Retorne ao Índice](#)

Paroaria dominicana



Foto: Mario Olyntho

O cardeal-do-nordeste é uma ave da família Thraupidae. Vive em mata baixa e rala. É visto na cidade de Alterosa e em seus arredores. Alimenta-se principalmente de sementes e, também, de insetos e frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/cardeal-do-nordeste>

Sanhaço-cinzento

Tangara sayaca

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

O sanhaço-cinzento é uma ave da família Thraupidae.

Ave muito comum em nosso país e, também, em Alterosa e nos arredores das Unidades de Conservação realçadas no presente guia.

Possui o hábito de andar em casais ou pequenos bandos.

Alimenta-se de frutos, folhas, brotos, flores e insetos, como aleluias, entre outros.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-cinzento>

Sanhaço-do-coqueiro

Tangara palmarum

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

O sanhaço-do-coqueiro é uma ave da família Thraupidae.

Vive em casais e pequenos grupos. É encontrado na região das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se caçando insetos no meio das folhas e em voo. Também come frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-do-coqueiro>

Saíra-amarela

Tangara cayana

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Flavio Guglielmino

A saíra-amarela é uma ave pertencente à família Thraupidae.

Seu *habitat* é em matas abertas e ciliares, áreas cultivadas, parques e jardins.

É encontrado frequentando a RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Vive em casais, nos diferentes estratos da vegetação.

Alimenta-se de frutos e insetos, como cupins e vespas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-amarela>

Canário-da-terra

Sicalis flaveola

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Luiz Fernando Figueiredo

O canário-da-terra é uma ave muito graciosa da família Thraupidae, chama atenção, considerando seu amarelo intenso. Possui hábitos em campos secos, bordas de matas, entre outros locais.

Muito abundante na região das RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos. Alimenta-se de sementes no chão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/canario-da-terra>

Tiziu

Volatinia jacarina

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Jarbas Mattos

O tiziu é uma ave pequena pertencente à família Thraupidae. Ave que vive em bandos, que podem chegar a dezenas de indivíduos. Possui o hábito de saltar para cima e pousar no mesmo local de origem. Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “ti” “ti” “tiziu”. É encontrado saltando nas cercas das RPPNs. Alimenta-se de sementes e de insetos que captura.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tiziu>

Tico-tico-rei-cinza

[Retorne ao Índice](#)

Coryphospingus pileatus



Foto (macho): Ferrão

O tico-tico-rei-cinza é uma ave pertencente à família Thraupidae.

Costuma ser visto na RPPN Josepha Mendes Ferrão e em seus arredores, andando no chão ou nos arbustos baixos, a pouca altura do solo.

Alimenta-se de sementes, esmagando-as com o bico. Come também insetos e outros artrópodes. Esporadicamente se alimenta de frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico-rei-cinza>

Tico-tico-rei

[Retorne ao Índice](#)

Coryphospingus cucullatus



Foto (macho): Flavio Guglielmino

O tico-tico-rei é uma ave pertencente à família Thraupidae.

Vive solitário a maior parte do ano, eventualmente juntando-se a bandos mistos de espécies granívoras.

É visto na RPPN Josepha Mendes Ferrão e em seus arredores.

Alimenta-se de sementes, brotos, frutas e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico-rei>

Tiê-preto

[Retorne ao Índice](#)

Tachyphonus coronatus



Foto (macho): Emerson Kaseker

O tiê-preto é uma ave da família Thraupidae.

O macho possui um topete vermelho, nem sempre aparente.

É encontrado nos fragmentos de mata das RPPNs Instituto Olho D'Água, Josepha Mendes Ferrão e São Francisco de Assis.

Costuma viver em casais e alimenta-se de frutos, sementes, flores e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-preto>

Saí-andorinha

Tersina viridis

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Maria Albers,



Foto (fêmea): Constantino Melo

A saí-andorinha é uma ave pertencente à família Thraupidae.

O macho desta espécie é azul-brilhante e a fêmea e o macho juvenil são esverdeados.

É visto na RPPN Josepha Mendes Ferrão e no Sítio São Dimas.

Alimenta-se de frutos e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-andorinha>

Saí-azul

Dacnis cayana

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Silvia Faustino Linhares



Foto (fêmea): Silvia Faustino Linhares

O saí-azul é uma ave pertencente à família Thraupidae.

O macho é azul e negro, com as pernas rosadas, enquanto a fêmea é verde, com a cabeça azulada e pernas alaranjadas.

É encontrado nas bordas das florestas das Unidades de Conservação em pauta (RPPNs e RL).

Alimenta-se de néctar, insetos e frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/sai-azul>

Cambacica

Coereba flaveola

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A cambacica é uma ave pertencente à família Thraupidae.

Vive solitária ou aos pares, sendo bastante ativa.

É comum encontrá-la na RPPN Josepha Mendes Ferrão e em seus arredores. Também podemos encontrá-la nas áreas urbanas de Cavacos e Alterosa.

Alimenta-se de néctar, frutas e artrópodes. Disputa com os beija-flores os alimentadores artificiais contendo água e açúcar.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/cambacica>

Bigodinho

Sporophila lineola

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Luiz Bravo

O bigodinho é uma ave pertencente à família Thraupidae.

Costuma formar bandos mistos com outras aves papa-capins. É encontrado frequentando áreas abertas da RPPN Josepha Mendes Ferrão e nas gramíneas do Sítio Videira e Sítio São Dimas.

Alimenta-se basicamente de sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bigodinho>

Baiano

[Retorne ao Índice](#)

Sporophila nigricollis



Foto (macho): Silvia Faustino Linhares

O baiano é também conhecido como bico-de-prata, ave pertencente à família Thraupidae.

Como o bigodinho, o baiano costuma formar bandos mistos com outras aves papa-capins.

Ave presente no município de Alterosa.

Alimenta-se de sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/baiano>

Papa-capim-de-costas-cinzas

[Retorne ao Índice](#)

Sporophila ardesiaca



Foto (macho): Jarbas Mattos

O papa-capim-de-costas-cinzas é uma ave da família Thraupidae. Costuma formar bandos mistos com outras aves papa-capins. Ave frequentadora das pastagens vizinhas às RPPNs. Alimenta-se de sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:
<http://www.wikiaves.com.br/papa-capim-de-costas-cinzas>

Coleirinho

[Retorne ao Índice](#)

Sporophila caerulescens



Foto (macho): Cárin Duarte

O coleirinho é uma ave pertencente à família Thraupidae.

Vivem em grupos de 6 a 20 indivíduos, inclusive às vezes formam grupos mistos com outras espécies de papa-capins e tizius.

Abundante na região da RPPN Josepha Mendes Ferrão e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Alimenta-se de sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/coleirinho>

Canário-do-campo

Emberizoides herbicola

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O canário-do-campo é uma ave da família Thraupidae.

Vive solitário ou em casais. É encontrado na região das Unidades de Conservação em destaque neste guia.

Alimenta-se caçando insetos e coletando sementes no chão ou no meio dos talos das gramíneas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/canario-do-campo>

Batuqueiro

Saltatricula atricollis

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Silvia Faustino Linhares

O batuqueiro, também conhecido como bico-de-pimenta, é uma ave pertencente à família Thraupidae.

Habita áreas abertas existentes no município de Alterosa.

Alimenta-se de sementes e artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/batuqueiro>

Trinca-ferro

Saltator similis

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O trinca-ferro, também conhecido como trinca-ferro-verdadeiro, é uma ave pertencente à família Thraupidae.

Habita as bordas da mata da Reserva Legal Pousada dos Tucanos, como também as bordas das matas das RPPNs.

Alimenta-se de frutos, insetos, sementes, folhas e flores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/trinca-ferro>

Saí-canário

[Retorne ao Índice](#)

Thlypopsis sordida



Foto (macho): Flavio Guglielmino

O saí-canário é uma ave da família Thraupidae.

Vive solitário, ou em pares no período reprodutivo.

Muitas vezes é encontrado entre a vegetação e árvores existentes na RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de frutos, sementes e insetos capturados na folhagem.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-canario>

Azulão

[Retorne ao Índice](#)

Cyanoloxia brissonii



Foto (macho): Emerson Kaseker



Foto (fêmea): Cárin Duarte

O azulão é uma ave pertencente à família Cardinalidae.

É encontrado na várzea e mata ciliar da Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

É uma ave territorialista, motivo pelo qual não são encontrados grupos de azulões, somente casais. O macho é totalmente azul-escuro, com partes azuis brilhantes, a fêmea e os filhotes são pardos.

Alimenta-se de sementes, frutas e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/azulao>

Pintassilgo

Spinus magellanicus

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Ferrão

O pintassilgo é uma ave pertencente à família Fringillidae.

Vive em bandos, pousa no alto das árvores e em pequenos arbustos nas bordas nas RPPNs e Reserva Legal Pousada dos Tucanos.

Infelizmente, essa ave tornou-se um pássaro raro devido, principalmente, à intensa perseguição do comércio clandestino de aves silvestres.

Alimenta-se de sementes e pequenos frutos secos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pintassilgo>

Fim-fim

Euphonia chlorotica

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Luciano Monferrari

O fim-fim é uma ave pertencente à família Fringillidae.

Habita matas baixa e ralas. Encontrado na RPPN Josepha Mendes Ferrão e propriedades vizinhas.

É um animal frugívoro, alimenta-se de frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/fim-fim>

Pardal

Passer domesticus

[Retorne ao Índice](#)



Foto (macho): Cárin Duarte

O pardal é uma ave exótica, proveniente da Europa, pertencente à família Passeridae.

Sua chegada ao Brasil foi através de soltura no Rio de Janeiro.

É encontrado na região onde fica a RPPN Josepha Mendes Ferrão.

Alimenta-se de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos de alimentos deixados pelos seres humanos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pardal>

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

AUTORES E ELABORADORES DO GUIA



DINÊILA CAMPOS RIBEIRO VIDEIRA, casada, alterosense, professora e técnica de contabilidade. Estudou em Alterosa - Minas Gerais. Braço direito de seu esposo em todos os projetos ambientais envolvidos. Proprietária e administradora de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, projetista e construtora da Capela São Francisco de Assis, ambientalista e também observadora de aves. Faz parte do grupo de associados do Centro de Estudos Ornitológicos - CEO.

Contato: dineilacrv@hotmail.com

FÁBIO FERRÃO VIDEIRA, casado, paulistano, biólogo, pesquisador, formado pela UNIESP, pós-graduado com especialização em MBA Gestão e Tecnologias Ambientais pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP. Policial Militar, presidente do Centro de Estudos Ornitológicos - CEO, coordenador do Projeto de Levantamento de Aves em Áreas Militares, coordenador técnico da Comissão do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico da Polícia Militar, responsável pelas passagens superiores de fauna arborícola instaladas na Zona Norte do município de São Paulo, proprietário e administrador

de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, projetista e construtor da Capela São Francisco de Assis, ambientalista, auditor do Selo Verde Ecolmeia, elaborador dos e-books Guia das Aves da Invernada do Barro Branco; Guia das Aves do Campo de Marte; Guia das Aves do Complexo Militar do Cambuci. Também possui o Título de "Cidadão Honorário Alterosense", concedido pela Câmara dos Vereadores de Alterosa em 2010.

Contato: ferrao.videira@hotmail.com

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL



MARCELO MENDES DE ALMEIDA, casado, técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho (atual Instituto Federal Campus Muzambinho), natural de Caconde - SP, funcionário da Prefeitura de Alterosa como Técnico Agrícola, produtor rural, proprietário do Sítio Videira e sua Reserva Particular do Patrimônio Natural Josepha Mendes Ferrão, Membro associado do Centro de Estudos Ornitológicos - CEO e também observador de aves.

Contato: mmacaconde@hotmail.com

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

REVISOR ORNITOLÓGICO



LUIZ FERNANDO DE ANDRADE FIGUEIREDO, médico, formado pela UFMG, pós-graduado com especialização em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Observador de aves e ornitólogo autodidata, membro honorário e fundador do Centro de Estudos Ornitológicos - CEO, primeiro secretário do CEO, membro do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO, editor do Boletim CEO e editor - técnico da Revista Atualidades Ornitológicas.

Contato: luizfigueiredo@uol.com.br

REVISORA GERAL



IRENE DE LACERDA RAMOS, amante incondicional da natureza, é professora Mestre em Química Ambiental pela Universidade Cruzeiro do Sul; licenciada, bacharel e pós-graduada em Química pelas Faculdades Oswaldo Cruz; pós-graduada em Arte-educação Ambiental pela ESALQ-USP; artista plástica, artesã e arte-educadora ambiental. Possui experiência ampla na área acadêmica, educativa, ambiental e artística há mais de 40 anos. Promove projetos ambientais e artísticos, workshops e palestras em Instituições de Ensino, empresas, associações, ONGs e comunidades, comercialmente ou voluntariamente. Atualmente trabalha com produções próprias e coletivas, confecção e comercialização de produtos, ministra cursos e eventos no ramo de Artes Plásticas, Artesanato e Arte-educação ambiental. Também faz parte do Centro de Estudos Ornitológicos - CEO. Possui publicações em livros e revistas, além de prêmios e exposições nas áreas educativa e artística.

Contato: irenequimica@yahoo.com.br

O **CENTRO DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 57.063.992/0001-13, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com objetivos de congregar pessoas interessadas na observação de aves, ornitologia e temas correlatos, no desenvolvimento de estudos ornitológicos, na contribuição para a conservação da natureza em geral e das aves em particular e para a educação ambiental da população.

[✉ ceo@ceo.org.br](mailto:ceo@ceo.org.br) [📧 centro-de-estudos-ornitologicos.blogspot.com](https://www.blogger.com/blog-post/centro-de-estudos-ornitologicos)

[📷 www.instagram.com/ceoornitologia](https://www.instagram.com/ceoornitologia) [📘 www.facebook.com/ceoornitologia](https://www.facebook.com/ceoornitologia)

Referências

CEO. **Centro de Estudos Ornitológicos**. Disponível no *link*:

<<http://www.ceo.org.br>>.

COPAM. Conselho Estadual de Política Ambiental. **Deliberação Normativa COPAM nº 147, de 30 abril 2010**. Aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais. Disponível no *link*:

<<http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=13192>>.

DEVELEY, P. F. e ENDRIGO. E. Guia de Campo - Aves da Grande São Paulo. **Aves & Fotos Editora**. 2ª ed. São Paulo/SP. 2011.

FERRÃO-VIDEIRA, F. Avifauna: instrumento educacional motivador para a preservação ambiental. 2010. 127p. TCC. **Faculdade Renascença - UNIESP**, São Paulo, 2010. Disponível no *link*:

<https://drive.google.com/file/d/0B_9_cRZw_Ya4ZFg4RUJ3NnVuTGM/view>.

FERRÃO-VIDEIRA, F. e FIGUEIREDO, L. F. A. Relatório de Levantamento da Avifauna de Alterosa, com destaque nas RPPNs Instituto Olho D'Água, Josepha Mendes Ferrão e São Francisco de Assis, e na Reserva Legal Pousada dos Tucanos. **Centro de Estudos Ornitológicos - CEO**. São Paulo, 2007/ 2020. Disponível no *link*:

<<https://drive.google.com/file/d/1psolxFmg87BRkr-ZJgtZkujpEYH1w8vr/view>>.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume III - Aves. In: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (Org.). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília: ICMBio. 709p. Disponível no *link*:

<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol3.pdf>.

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Nomenclatura e ordem sistemática. **Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO**, versão 2015. Disponível no *link*:
<<http://www.cbro.org.br/>>.

ROBERT, S. R. *et al.* Tradução ARGEL, M. *Wildlife Conservation Society - Aves do Brasil - Mata Atlântica do Sudeste*. **Editora Horizonte**. São Paulo/SP. 2015.

VIDEIRA, F. F. Guia das Aves da Invernada do Barro Branco / **Centro de Estudos Ornitológicos**. 1 ed. São Paulo, Fontenele Publicações, 2020. 144p. Disponível no *link*:
<https://drive.google.com/open?id=1vPVEI2bMIGQXkthdXXTZbIVv_QDBijym>.

VIDEIRA, F. F. Guia das Aves do Campo de Marte / **Centro de Estudos Ornitológicos**. 1 ed. São Paulo, Fontenele Publicações, 2020. 131p. Disponível no *link*:
<https://drive.google.com/file/d/1_Y5_0-3MV_jiEKzDGDNVa9zO2HJDPgEW/view>.

VIDEIRA, F. F. Guia das Aves do Complexo Militar do Cambuci / **Centro de Estudos Ornitológicos**. 1 ed. São Paulo, Fontenele Publicações, 2020. 93p. Disponível no *link*:
<<https://drive.google.com/file/d/1hNVc-E4M0JxHfR9i2n6ATOmINsm7Et7d/view>>.

WIKIAVES. **A Enciclopédia das Aves do Brasil**. Disponível no *link*:
<<https://www.wikiaves.com.br>>.

WIKIAVES. Espécies em Alterosa/MG. **A Enciclopédia das Aves do Brasil**. Disponível no *link*:
<<http://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=c&c=3102001>>.

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

Patrocinadores



Consultoria e Assessoria Ambiental
Ferrão Videira



Apoio



Bem Estar



INTELIGÊNCIA



Zumkeller
CASA & CONSTRUÇÃO

Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs

LISTA ADICIONAL DE ESPÉCIES ENCONTRADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO E-BOOK

“GUIA DAS AVES DE ALTEROSA E SUAS RPPNs” - 1ª Edição em Outubro de 2020

EBOOK ISBN – 978-65-5871-034-9

Taxon	Nome em Português	English Name
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	Pied-billed Grebe
<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	Anhinga
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	Robust Woodpecker
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	Short-crested Flycatcher
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	Long-tailed Tyrant
<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroadado	Rufous-crowned Greenlet
<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena	Tawny-headed Swallow
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	Gray-breasted Martin
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	Masked Yellowthroat
<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato	Flavescent Warbler
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	White-browed Warbler
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	Great Pampa-Finch
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	Black-goggled Tanager

Totalizando no estudo **178 espécies de Aves** distribuídas em 23 Ordens e 52 Famílias, conforme o Relatório Oficial do CEO disponível no link abaixo:

https://drive.google.com/file/d/10JgOb4OODehyS5cXouBqmN8yIFZgSluB/view?usp=drive_link

FABIO FERRAO

VIDEIRA:14390708813

Assinado de forma digital por FABIO
FERRAO VIDEIRA:14390708813
Dados: 2023.08.03 15:12:18 -03'00'

Biólogo pós-graduado - CRBio nº 079407/01-D

Presidente do Centro de Estudos Ornitológicos – CEO

Autor e Elaborador do Guia das Aves de Alterosa e suas RPPNs



FONTELE
PUBLICAÇÕES

São Paulo - 2020

LISTA DA AVIFAUNA ENCONTRADA NO MUNICÍPIO DE ALTEROSA / MG - BRASIL

CENTRO DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS - CEO

“GUIA DAS AVES DE ALTEROSA E SUAS RPPNs”

EBOOK ISBN – 978-65-5871-034-9

O	F	E	Taxon	Nome em Português	English Name	Ordem sistemática
1			Tinamiformes			1
	1		Tinamidae			2
		1	<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó	Small-billed Tinamou	3
1			Anseriformes			4
	1		Anatidae			5
		1	<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	White-faced Whistling-Duck	6
		1	<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	Muscovy Duck	7
		1	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananaí	Brazilian Teal	8
1			Galliformes			9
	1		Cracidae			10
		1	<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu	Dusky-legged Guan	11
1			Podicipediformes			12
	1		Podicipedidae			13
		1	<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	Pied-billed Grebe	14
1			Columbiformes			15
	1		Columbidae			16
		1	<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico	Rock Pigeon	17
		1	<i>Patagioenas picazuro</i>	pomba-asa-branca	Picazuro Pigeon	18
		1	<i>Leptotila verreauxi</i>	juritipupu	White-tipped Dove	19
		1	<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	Eared Dove	20
		1	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	Ruddy Ground-Dove	21
		1	<i>Columbina squammata</i>	rolinha-fogo-apagou	Scaled Dove	22
1			Cuculiformes			23
	1		Cuculidae			24
		1	<i>Guira guira</i>	anu-branco	Guira Cuckoo	25

	1	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	Smooth-billed Ani	26
		1 <i>Tapera naevia</i>	saci	Striped Cuckoo	27
		1 <i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	Squirrel Cuckoo	28
1		Caprimulgiformes			29
	1	Caprimulgidae			30
		1 <i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	Common Pauraque	31
1		Apodiformes			32
	1	Apodidae			33
		1 <i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	Sick's Swift	34
1		Trochilidae			35
		1 <i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	Planalto Hermit	36
		1 <i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta	White-vented Violetear	37
		1 <i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	Glittering-bellied Emerald	38
		1 <i>Thalurania furcata</i>	beija-flor-tesoura-verde	Fork-tailed Woodnymph	39
		1 <i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	Violet-capped Woodnymph	40
		1 <i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	Swallow-tailed Hummingbird	41
		1 <i>Chionomesa lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	Sapphire-spangled Emerald	42
1		Gruiformes			43
	1	Aramidae			44
		1 <i>Aramus guarauna</i>	carão	Limpkin	45
	1	Rallidae			46
		1 <i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	Blackish Rail	47
		1 <i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	Slaty-breasted Wood-Rail	48
		1 <i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água	Common Gallinule	49
1		Charadriiformes			50
	1	Charadriidae			51
		1 <i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	Southern Lapwing	52
	1	Recurvirostridae			53
		1 <i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	White-backed Stilt	54
	1	Scolopacidae			55
		1 <i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	Pectoral Sandpiper	56
	1	Jacanidae			57
		1 <i>Jacana jacana</i>	jaçanã	Wattled Jacana	58
1		Ciconiiformes			59

1	Ciconiidae			60	
	1	<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú	Jabiru	61
	1	<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	Wood Stork	62
1		Suliformes			63
	1	Anhingidae			64
	1	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	Anhinga	65
	1	Phalacrocoracidae			66
	1	<i>Nannopterum brasilianum</i>	biguá	Neotropic Cormorant	67
1		Pelecaniformes			68
	1	Ardeidae			69
	1	<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	Black-crowned Night-Heron	70
	1	<i>Butorides striata</i>	socozinho	Striated Heron	71
	1	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	Cattle Egret	72
	1	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	Cocoi Heron	73
	1	<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	Great Egret	74
	1	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	Whistling Heron	75
	1	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	Snowy Egret	76
1		Threskiornithidae			77
	1	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	Green Ibis	78
	1	<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	Bare-faced Ibis	79
	1	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	Buff-necked Ibis	80
	1	<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	Roseate Spoonbill	81
1		Cathartiformes			82
	1	Cathartidae			83
	1	<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	King Vulture	84
	1	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto	Black Vulture	85
	1	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	Turkey Vulture	86
1		Accipitriformes			87
	1	Accipitridae			88
	1	<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	White-tailed Kite	89
	1	<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	Plumbeous Kite	90
	1	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	Savanna Hawk	91
	1	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	Roadside Hawk	92
	1	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	White-tailed Hawk	93

	1	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	águia-serrana	Black-chested Buzzard-Eagle	94
1		Strigiformes			95
	1	Tytonidae			96
	1	<i>Tyto furcata</i>	suindara	American Barn Owl	97
	1	Strigidae			98
	1	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	Tropical Screech-Owl	99
	1	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	Burrowing Owl	100
1		Coraciiformes			101
	1	Alcedinidae			102
	1	<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	Amazon Kingfisher	103
1		Galbuliformes			104
	1	Galbulidae			105
	1	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	Rufous-tailed Jacamar	106
	1	Bucconidae			107
	1	<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	White-eared Puffbird	108
1		Piciformes			109
	1	Ramphastidae			110
	1	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	Toco Toucan	111
	1	Picidae			112
	1	<i>Picumnus cirratus</i>	picapauzinho-barrado	White-barred Piculet	113
	1	<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	White Woodpecker	114
	1	<i>Veniliornis passerinus</i>	pica-pau-pequeno	Little Woodpecker	115
	1	<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	Robust Woodpecker	116
	1	<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	Lineated Woodpecker	117
	1	<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	Blond-crested Woodpecker	118
	1	<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	Green-barred Woodpecker	119
	1	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	Campo Flicker	120
1		Cariamiformes			121
	1	Cariamidae			122
	1	<i>Cariama cristata</i>	seriema	Red-legged Seriema	123
1		Falconiformes			124
	1	Falconidae			125
	1	<i>Caracara plancus</i>	carcará	Crested Caracara	126
	1	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Yellow-headed Caracara	127

	1	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	American Kestrel	128
1		Psittaciformes			129
	1	Psittacidae			130
	1	<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	Yellow-chevroned Parakeet	131
	1	<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	Turquoise-fronted Parrot	132
	1	<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	Blue-winged Parrotlet	133
	1	<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei	Peach-fronted Parakeet	134
	1	<i>Aratinga auricapillus</i>	jandaia-de-testa-vermelha	Golden-capped Parakeet	135
	1	<i>Primolius maracana</i>	maracanã	Blue-winged Macaw	136
	1	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão	White-eyed Parakeet	137
1		Passeriformes			138
	1	Thamnophilidae			139
	1	<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	Plain Antvireo	140
	1	<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	Barred Antshrike	141
	1	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	Variable Antshrike	142
	1	Conopophagidae			143
	1	<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	Rufous Gnateater	144
	1	Dendrocolaptidae			145
	1	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	Planalto Woodcreeper	146
	1	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado	Lesser Woodcreeper	147
	1	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado	Narrow-billed Woodcreeper	148
	1	Xenopidae			149
	1	<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	Streaked Xenops	150
	1	Furnariidae			151
	1	<i>Furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama	Wing-banded Hornero	152
	1	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	Rufous Hornero	153
	1	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	joão-de-pau	Rufous-fronted Thornbird	154
	1	<i>Phacellodomus ferrugineigula</i>	joão-botina-do-brejo	Orange-breasted Thornbird	155
	1	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	Yellow-chinned Spinetail	156
	1	<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	Spix's Spinetail	157
	1	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	Yellow-olive Flycatcher	158
	1	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque	Gray-headed Tody-Flycatcher	159
	1	<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	Common Tody-Flycatcher	160
1		Tyrannidae			161

1	<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	Cliff Flycatcher	162
1	<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	Yellow-bellied Elaenia	163
1	<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	White-crested Tyrannulet	164
1	<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	Short-crested Flycatcher	165
		maria-cavaleira-de-rabo-		
1	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	enferrujado	Brown-crested Flycatcher	166
1	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Great Kiskadee	167
1	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	Cattle Tyrant	168
1	<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	Streaked Flycatcher	169
1	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	Boat-billed Flycatcher	170
1	<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	Social Flycatcher	171
1	<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca	White-throated Kingbird	172
1	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	Tropical Kingbird	173
1	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	Southern Fork-tailed Flycatcher	174
1	<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	Long-tailed Tyrant	175
1	<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	White-headed Marsh Tyrant	176
1	<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	Masked Water-Tyrant	177
1	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	Vermilion Flycatcher	178
1	<i>Gubernetes yetapa</i>	tesoura-do-brejo	Streamer-tailed Tyrant	179
1	<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	Bran-colored Flycatcher	180
1	<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	Yellow-browed Tyrant	181
1	<i>Knipolegus lophotes</i>	maria-preta-de-penacho	Crested Black-Tyrant	182
1	<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	White-rumped Monjita	183
1	<i>Nengetus cinereus</i>	primavera	Gray Monjita	184
1	Vireonidae			185
1	<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado	Rufous-crowned Greenlet	186
1	<i>Vireo chivi</i>	juruviana	Chivi Vireo	187
1	Corvidae			188
1	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	Curl-crested Jay	189
1	<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-piçaca	Plush-crested Jay	190
1	Hirundinidae			191
1	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	Blue-and-white Swallow	192
1	<i>Alopocheidon fucata</i>	andorinha-morena	Tawny-headed Swallow	193
1	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	Southern Rough-winged	194

			Swallow	
	1	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	Brown-chested Martin 195
	1	<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande	Gray-breasted Martin 196
	1	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	White-rumped Swallow 197
1		Troglodytidae		198
	1	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	Southern House Wren 199
1		Donacobiidae		200
	1	<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim	Black-capped Donacobius 201
1		Turdidae		202
	1	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	Pale-breasted Thrush 203
	1	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Rufous-bellied Thrush 204
	1	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	Creamy-bellied Thrush 205
1		Mimidae		206
	1	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Chalk-browed Mockingbird 207
1		Passeridae		208
	1	<i>Passer domesticus</i>	pardal	House Sparrow 209
1		Fringillidae		210
	1	<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo	Hooded Siskin 211
	1	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	Purple-throated Euphonia 212
1		Passerellidae		213
	1	<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	Grassland Sparrow 214
	1	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	Rufous-collared Sparrow 215
1		Icteridae		216
	1	<i>Leistes superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	White-browed Meadowlark 217
	1	<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	Crested Oropendola 218
	1	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	Variable Oriole 219
	1	<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	Shiny Cowbird 220
	1	<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	Chopi Blackbird 221
	1	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	Chestnut-capped Blackbird 222
	1	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chupim-do-brejo	Yellow-rumped Marshbird 223
1		Parulidae		224
	1	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	Masked Yellowthroat 225
	1	<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato	Flavescent Warbler 226
	1	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	White-browed Warbler 227

	1	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	Golden-crowned Warbler	228
1		Cardinalidae			229
	1	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão	Ultramarine Grosbeak	230
1		Thraupidae			231
	1	<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	Great Pampa-Finch	232
	1	<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	Wedge-tailed Grass-Finch	233
	1	<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	Swallow Tanager	234
	1	<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	Blue Dacnis	235
	1	<i>Saltatricula atricollis</i>	batuqueiro	Black-throated Saltator	236
	1	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	Green-winged Saltator	237
	1	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	Bananaquit	238
	1	<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	Blue-black Grassquit	239
	1	<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	Black-goggled Tanager	240
	1	<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza	Pileated Finch	241
	1	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	Red-crested Finch	242
	1	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	Ruby-crowned Tanager	243
	1	<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	Lined Seedeater	244
	1	<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	Yellow-bellied Seedeater	245
	1	<i>Sporophila ardesiaca</i>	papa-capim-de-costas-cinza	Dubois's Seedeater	246
	1	<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	Double-collared Seedeater	247
	1	<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	Orange-headed Tanager	248
	1	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	Saffron Finch	249
	1	<i>Paroaria dominicana</i>	cardeal-do-nordeste	Red-cowled Cardinal	250
	1	<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento	Sayaca Tanager	251
	1	<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	Palm Tanager	252
	1	<i>Stilpnia cayana</i>	saíra-amarela	Burnished-buff Tanager	253

23 52 178

Legenda:

O: Ordem

F: Família

E: espécie

FABIO FERRAO

VIDEIRA:14390708813

Assinado de forma digital por

FABIO FERRAO

VIDEIRA:14390708813

Dados: 2023.08.03 15:07:27 -03'00'

Biólogo e Presidente do CEO

www.ceo.org.br

Visita	Número acumulado de espécies	Datas das observações
1	67	09 - 16/01/2009
2	73	23 - 27/02/2009
3	84	11/10/2010
4	96	20 - 31/01/2011
5	118	16 - 18/07/2011
6	131	16 - 18/11/2013
7	133	19 - 20/01/2014
8	164	Somado as outras datas esporádicas de observação entre 2015 a 2020
9	167	Somado a outra data esporádica de observação entre 2021
10	171	14 - 15/01/2023
11	173	07 - 09/04/2023
12	175	11/06/2023
13	178	27/07/2023

Ordens: 23
Famílias: 52
Espécies: 178

