

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO MÉDICO

BOLETIM INTERNO DO C MED

<https://drive.google.com/file/d/1wK2IGuQc1mSBezYPoCcyxatPHQkAyQ1-/view>

O Chefe do C MED publica para conhecimento e devida execução o seguinte:

INVENTÁRIO DA FAUNA SILVESTRE DO COMPLEXO DA INVERNADA DO BARRO BRANCO, COM ÊNFASE NO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ATUALIZADO EM JAN20.

Fica publicado em Boletim Interno do C Med a atualização do levantamento faunístico silvestre do complexo da Invernada do Barro Branco, com ênfase no Centro Médico, realizado pelo Subtenente PM 942.506-3 FÁBIO FERRÃO VIDEIRA, Biólogo, Pesquisador e Especialista com MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais pela Universidade de São Paulo, inscrito no CRBio sob o nº 79.407/01-D, Coordenador Técnico da Comissão do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico (CVMA / C Med), Presidente do Centro de Estudos Ornitológicos (CEO) e Coordenador do Projeto de Levantamento de Aves em Áreas Militares desenvolvido nas Forças Armadas e PMESP, mediante colaboração de profissionais da Divisão da Fauna Silvestre da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA); Instituto Butantan (IB); Instituto Florestal (IF) e CEO.

O estudo em evidência iniciou-se em 2007 e anualmente são acrescentadas novas espécies, demonstrando que a mata do complexo da Invernada do Barro Branco da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde se localiza o Centro Médico, possui uma rica e abundante fauna silvestre, com grande potencial de acréscimo de novas espécies silvestres.

As técnicas utilizadas pelo Biólogo e Subten PM FERRÃO foram por observações visuais, áudios, auxílio fotográfico, registros encontrados de animais mortos, feridos e moribundos no interior do complexo da Invernada do Barro Branco e por filmagens/fotografias obtidas mediante câmeras Trap (Trophy Cam DIGITAL – BUSHNELL), ativadas por sensores de movimento, instaladas na mata da Invernada e na Passagem Superior de Fauna (PSF) que liga os fragmentos de mata da Invernada do Barro Branco e do Parque Estadual Alberto Löfgren, conhecido como Horto Florestal. Passagem que permite o trânsito seguro, livre de atropelamentos e eletrocussões entre os fragmentos mencionados, propiciando que duas áreas verdes dos limites da cidade, separadas por área urbana, sejam livremente visitadas pela fauna arborícola, minimizando os impactos negativos do crescimento da antropização sem a devida atenção à sustentabilidade.

Até o momento, foram encontradas **148 (cento e quarenta e oito) espécies de fauna silvestre distribuídas em 58 (cinquenta e oito) Famílias e 26 (vinte e seis) Ordens dos grupos: Herpetofauna (répteis e anfíbios); Avifauna (aves) e Mastofauna (mamíferos)**, conforme tabelas abaixo:

Tabela I – Lista da Herpetofauna encontrada no complexo da Invernada do Barro Branco - PMESP.

| O | F | G/E | TAXON | NOME POPULAR | OBSERVAÇÃO |
|-------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <u>CLASSE AMPHIBIA</u> | | | | | |
| 1 | | | ANURA | | |
| | 1 | | Bufo | | |
| | | 1 | <i>Rhinella icterica</i> | sapo-cururu | endêmica |
| | | 1 | <i>Rhinella ornata</i> | sapo-cururuzinho | endêmica |
| | 1 | | Hylidae | | |
| | | 1 | <i>Hypsiboas cf faber</i> | sapo-martelo | nativa |
| | | 1 | <i>Scinax</i> sp. | perereca-de-banheiro | endêmica |
| <u>CLASSE REPTILIA</u> | | | | | |
| 1 | | | TESTUDINES | | |
| | 1 | | Chelidae | | |
| | | 1 | <i>Hydromedusa tectifera</i> | cágado-pescoço-de-cobra | nativa |
| 1 | | | SQUAMATA | | |
| | 1 | | Teiidae | | |
| | | 1 | <i>Salvator merianae</i> | lagarto-teiú | nativa |
| | 1 | | Colubridae | | |
| | | 1 | <i>Chironius bicarinatus</i> | cobra-cipó | nativa |
| | 1 | | Dipsadidae | | |
| | | 1 | <i>Erythrolamprus j. jaegeri</i> | cobra-verde | nativa |
| | | 1 | <i>Erythrolamprus miliaris</i> | cobra-d'água | nativa |
| | 1 | | Viperidae | | |
| | | 1 | <i>Bothrops jararaca</i> | jararaca | nativa / AMEAÇADA |
| | | 1 | <i>Crotalus durissus terrificus</i> | cascavel | nativa |
| 3 | 7 | 11 | TOTAL | | |

Legenda: **O**: Ordem / **F**: Família / **G/E**: Gênero e Espécie.

* **Obs.:** Foi encontrado um exemplar de *Chelonoidis* sp. (CLASSE: **REPTILIA**; Ordem: **TESTUDINATA**; Família: **Testudinidae**), conhecido popularmente como jabuti, no estacionamento do C Med em 2017, possivelmente ocorrência de soltura ilegal na área. Registro não computado no presente estudo.

Tabela II – Lista da Avifauna encontrada no Complexo da Invernada do Barro Branco - PMESP.

| O | F | E | TAXON | NOME POPULAR | OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <u>CLASSE AVE</u> | | | | | |
| 1 | | | TINAMIFORMES | | |
| | 1 | | Tinamidae | | |
| | | 1 | <i>Crypturellus tataupa</i> | inhambu-chintã | nativa |
| 1 | | | GALLIFORMES | | |
| | 1 | | Cracidae | | |
| | | 1 | <i>Penelope obscura</i> | jacuguaçu | nativa / NT = quase ameaçada |
| 1 | | | PELECANIFORMES | | |
| | 1 | | Ardeidae | | |
| | | 1 | <i>Nycticorax nycticorax</i> | socó-dorminhoco | nativa |
| | | 1 | <i>Butorides striata</i> | socozinho | nativa |
| | | 1 | <i>Ardea alba</i> | garça-branca | nativa |
| | | 1 | <i>Syrigma sibilatrix</i> | maria-faceira | nativa |
| | | 1 | <i>Egretta thula</i> | garça-branca-pequena | nativa |
| | 1 | | Threskiornithidae | | |
| | | 1 | <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | coró-coró | nativa |
| 1 | | | CATHARTIFORMES | | |
| | 1 | | Cathartidae | | |
| | | 1 | <i>Coragyps atratus</i> | urubu | nativa |
| 1 | | | ACCIPITRIFORMES | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Accipitridae | | |
| | 1 <i>Accipiter striatus</i> | tauató-miúdo | nativa |
| | 1 <i>Rupornis magnirostris</i> | gavião-carijó | nativa |
| | 1 <i>Buteo brachyurus</i> | gavião-de-cauda-curta | nativa |
| | 1 <i>Spizaetus tyrannus</i> | gavião-pega-macaco | nativa / VU = vulnerável |
| 1 | GRUIFORMES | | |
| | 1 Rallidae | | |
| | 1 <i>Aramides saracura</i> | saracura-do-mato | endêmica |
| | 1 <i>Pardirallus nigricans</i> | saracura-sanã | nativa |
| 1 | CHARADRIIFORMES | | |
| | 1 Charadriidae | | |
| | 1 <i>Vanellus chilensis</i> | quero-quero | nativa |
| 1 | COLUMBIFORMES | | |
| | 1 Columbidae | | |
| | 1 <i>Columbina talpacoti</i> | rolinha | nativa |
| | 1 <i>Columba livia</i> | pombo-doméstico | exótica |
| | 1 <i>Patagioenas picazuro</i> | asa-branca | nativa |
| | 1 <i>Zenaida auriculata</i> | avoante | nativa |
| | 1 <i>Leptotila verreauxi</i> | juriti-pupu | nativa |
| | 1 <i>Leptotila rufaxilla</i> | juriti-de-testa-branca | nativa |
| 1 | CUCULIFORMES | | |
| | 1 Cuculidae | | |
| | 1 <i>Piaya cayana</i> | alma-de-gato | nativa |
| | 1 <i>Coccyzus euleri</i> | papa-lagarta-de-euler | nativa |
| | 1 <i>Crotophaga ani</i> | anu-preto | nativa |
| | 1 <i>Guira guira</i> | anu-branco | nativa |
| 1 | STRIGIFORMES | | |
| | 1 Strigidae | | |
| | 1 <i>Megascops choliba</i> | corujinha-do-mato | nativa |
| | 1 <i>Asio clamator</i> | coruja-orelhuda | nativa |
| 1 | CAPRIMULGIFORMES | | |
| | 1 Caprimulgidae | | |
| | 1 <i>Lurocalis semitorquatus</i> | tuju | nativa |
| | 1 <i>Nyctidromus albicollis</i> | bacurau | nativa |
| | 1 <i>Hydropsalis torquata</i> | bacurau-tesoura | |
| 1 | APODIFORMES | | |
| | 1 Apodidae | | |
| | 1 <i>Chaetura meridionalis</i> | andorinhão-do-temporal | nativa |
| 1 | Trochilidae | | |
| | 1 <i>Phaethornis pretrei</i> | rabo-branco-acanelado | nativa |
| | 1 <i>Eupetomena macroura</i> | beija-flor-tesoura | nativa |
| | 1 <i>Thalurania glaucopis</i> | beija-flor-de-fronte-violeta | endêmica |
| | 1 <i>Amazilia lactea</i> | beija-flor-de-peito-azul | nativa |
| 1 | TROGONIFORMES | | |
| | 1 Trogonidae | | |
| | 1 <i>Trogon surrucura</i> | surucuá-variado | endêmica |
| 1 | PICIFORMES | | |
| | 1 Ramphastidae | | |
| | 1 <i>Ramphastos toco</i> | tucanuçu | nativa |
| | 1 <i>Ramphastos vitellinus</i> | tucano-de-bico-preto | nativa / CR = criticamente em perigo |
| | 1 <i>Ramphastos dicolorus</i> | tucano-de-bico-verde | endêmica |
| 1 | Picidae | | |
| | 1 <i>Picumnus temminckii</i> | pica-pau-anão-de-coleira | endêmica |
| | 1 <i>Melanerpes candidus</i> | pica-pau-branco | nativa |
| | 1 <i>Veniliornis spilogaster</i> | picapauzinho-verde-carijó | endêmica |
| | 1 <i>Colaptes melanochloros</i> | pica-pau-verde-barrado | nativa / EN = em perigo |
| | 1 <i>Colaptes campestris</i> | pica-pau-do-campo | nativa |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| | 1 | <i>Celeus flavescens</i> | pica-pau-de-cabeça-amarela | nativa |
| | 1 | <i>Dryocopus lineatus</i> | pica-pau-de-banda-branca | nativa |
| 1 | | FALCONIFORMES | | |
| | 1 | Falconidae | | |
| | 1 | <i>Caracara plancus</i> | carcará | nativa |
| | 1 | <i>Milvago chimachima</i> | carrapateiro | nativa |
| | 1 | <i>Falco femoralis</i> | falcão-de-coleira | nativa |
| 1 | | PSITTACIFORMES | | |
| | 1 | Psittacidae | | |
| | 1 | <i>Diopsittaca nobilis</i> | maracanã-pequena | nativa / CR = critica- mente em perigo |
| | 1 | <i>Psittacara leucophthalmus</i> | periquitão | nativa |
| | 1 | <i>Pyrrhura frontalis</i> | tiriba | nativa |
| | 1 | <i>Forpus xanthopterygius</i> | tuim | endêmica |
| | 1 | <i>Brotogeris tirica</i> | periquito-verde | endêmica |
| | 1 | <i>Pionus maximiliani</i> | maitaca | nativa |
| | 1 | <i>Amazona aestiva</i> | papagaio | nativa |
| 1 | | PASSERIFORMES | | |
| | 1 | Thamnophilidae | | |
| | 1 | <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> | chorozinho-de-asa-vermelha | nativa |
| | 1 | <i>Thamnophilus caerulescens</i> | choca-da-mata | nativa |
| | 1 | Conopophagidae | | |
| | 1 | <i>Conopophaga lineata</i> | chupa-dente | endêmica |
| | 1 | Dendrocolaptidae | | |
| | 1 | <i>Sittasomus griseicapillus</i> | arapaçu-verde | nativa |
| | 1 | <i>Xiphorhynchus fuscus</i> | arapaçu-rajado | endêmica |
| | 1 | <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> | arapaçu-grande | nativa |
| | 1 | Furnariidae | | |
| | 1 | <i>Furnarius rufus</i> | joão-de-barro | nativa / NT = quase ameaçada |
| | 1 | <i>Lochmias nematura</i> | joão-porca | nativa |
| | 1 | <i>Syndactyla rufosuperciliata</i> | trepador-quiete | nativa |
| | 1 | <i>Synallaxis ruficapilla</i> | pichororé | endêmica |
| | 1 | <i>Synallaxis spixi</i> | joão-teneném | nativa |
| | 1 | <i>Cranioleuca pallida</i> | arredio-pálido | endêmica |
| | 1 | Cotingidae | | |
| | 1 | <i>Pyroderus scutatus</i> | pavó | endêmica / VU = vulnerável |
| | 1 | <i>Procnias nudicollis</i> | araponga | endêmica / VU = vulnerável |
| | 1 | Rhynchocyclidae | | |
| | 1 | <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | bico-chato-de-orelha-preta | nativa |
| | 1 | <i>Todirostrum cinereum</i> | ferreirinho-relógio | nativa |
| | 1 | Tyrannidae | | |
| | 1 | <i>Hirundinea ferruginea</i> | gibão-de-couro | nativa |
| | 1 | <i>Camptostoma obsoletum</i> | risadinha | nativa |
| | 1 | <i>Pitangus sulphuratus</i> | bem-te-vi | nativa |
| | 1 | <i>Myiodynastes maculatus</i> | bem-te-vi-rajado | nativa |
| | 1 | <i>Megarynchus pitangua</i> | neinei | nativa |
| | 1 | <i>Myiozetetes similis</i> | bentevizinho-de-penacho-vermelho | nativa |
| | 1 | <i>Tyrannus melancholicus</i> | suiriri | nativa |
| | 1 | <i>Tyrannus savana</i> | tesourinha | migratória |
| | 1 | <i>Empidonomus varius</i> | peitica | nativa |
| | 1 | <i>Myiophobus fasciatus</i> | filipe | nativa |
| | 1 | <i>Fluvicola nengeta</i> | lavadeira-mascarada | nativa |
| | 1 | <i>Lathrotriccus euleri</i> | enferrujado | nativa |
| | 1 | <i>Xolmis velatus</i> | noivinha-branca | nativa |
| | 1 | Vireonidae | | |
| | 1 | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | pitiguari | nativa |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------|----------|
| | 1 | <i>Hylophilus poicilotis</i> | verdinho-coroado | endêmica |
| | 1 | <i>Vireo chivi</i> | juruviana | nativa |
| 1 | | Corvidae | | |
| | 1 | <i>Cyanocorax chrysops</i> | gralha-piçaça | nativa |
| 1 | | Hirundinidae | | |
| | 1 | <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> | andorinha-pequena-de-casa | nativa |
| 1 | | Troglodytidae | | |
| | 1 | <i>Troglodytes musculus</i> | corruíra | nativa |
| 1 | | Turdidae | | |
| | 1 | <i>Turdus flavipes</i> | sabiá-una | nativa |
| | 1 | <i>Turdus leucomelas</i> | sabiá-branco | nativa |
| | 1 | <i>Turdus rufiventris</i> | sabiá-laranjeira | nativa |
| | 1 | <i>Turdus amaurochalinus</i> | sabiá-poca | nativa |
| 1 | | Mimidae | | |
| | 1 | <i>Mimus saturninus</i> | sabiá-do-campo | nativa |
| 1 | | Passerellidae | | |
| | 1 | <i>Zonotrichia capensis</i> | tico-tico | nativa |
| 1 | | Parulidae | | |
| | 1 | <i>Setophaga pitiayumi</i> | mariquita | nativa |
| | 1 | <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | pia-cobra | nativa |
| | 1 | <i>Basileuterus culicivorus</i> | pula-pula | nativa |
| | 1 | <i>Myiothlypis leucoblephara</i> | pula-pula-assobiador | endêmica |
| 1 | | Icteridae | | |
| | 1 | <i>Molothrus bonariensis</i> | chupim | nativa |
| 1 | | Thraupidae | | |
| | 1 | <i>Pipraeidea melanonota</i> | saíra-viúva | nativa |
| | 1 | <i>Tangara desmaresti</i> | saíra-lagarta | endêmica |
| | 1 | <i>Tangara sayaca</i> | sanhaçu-cinzento | nativa |
| | 1 | <i>Tangara palmarum</i> | sanhaçu-do-coqueiro | nativa |
| | 1 | <i>Tangara cayana</i> | saíra-amarela | nativa |
| | 1 | <i>Conirostrum speciosum</i> | figuinha-de-rabo-castanho | nativa |
| | 1 | <i>Sicalis flaveola</i> | canário-da-terra | nativa |
| | 1 | <i>Trichothraupis melanops</i> | tiê-de-topete | nativa |
| | 1 | <i>Tachyphonus coronatus</i> | tiê-preto | endêmica |
| | 1 | <i>Dacnis cayana</i> | saí-azul | nativa |
| | 1 | <i>Coereba flaveola</i> | cambacica | nativa |
| | 1 | <i>Sporophila caerulescens</i> | coleirinho | nativa |
| | 1 | <i>Saltator similis</i> | trinca-ferro | nativa |
| | 1 | <i>Thlypopsis sordida</i> | saí-canário | nativa |
| 1 | | Cardinalidae | | |
| | 1 | <i>Habia rubica</i> | tiê-de-bando | nativa |
| 1 | | Fringillidae | | |
| | 1 | <i>Spinus magellanicus</i> | pintassilgo | nativa |
| 1 | | Passeridae | | |
| | 1 | <i>Passer domesticus</i> | pardal | exótica |

17 39 120 TOTAL

Fonte (adaptada): http://www.ceo.org.br/relatorios/Invernada_da_PM.xls - Relatório da Invernada do Barro Branco da PMESP. Responsável: Biólogo Fábio Ferrão Videira, CRBio 79407/01-D.

Legenda: O: Ordem / F: Família / G/E: Gênero e Espécie.

Tabela III – Lista da Mastofauna encontrada no Complexo da Invernada do Barro Branco - PMESP.

| O | F | E | TAXON | NOME POPULAR | OBSERVAÇÃO |
|----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | <u>CLASSE MAMMALIA</u> | | |
| 1 | | | DIDELPHIMORPHIA | | |
| | 1 | | Didelphidae | | |
| | | 1 | <i>Didelphis aurita</i> | gambá-de-orelha-preta | nativa |
| 1 | | | PRIMATES | | |
| | 1 | | Callitrichidae | | |
| | | 1 | <i>Callithrix</i> sp. | sagui (híbrido) | exótica |
| | | 1 | <i>Callithrix jacchus</i> | sagui-de-tufo-branco | exótica |
| | | 1 | <i>Callithrix penicillata</i> | sagui-de-tufo-preto | exótica |
| | 1 | | Cebidae | | |
| | | 1 | <i>Sapajus</i> sp. | macaco-prego | endêmica |
| | 1 | | Atelidae | | |
| | | 1 | <i>Alouatta clamitans</i> | bugio-ruivo | endêmica / AMEAÇADA |
| 1 | | | CARNIVORA | | |
| | 1 | | Mustelidae | | |
| | | 1 | <i>Eira barbara</i> | irara | nativa |
| | 1 | | Procyonidae | | |
| | | 1 | <i>Nasua nasua</i> | quati | nativa |
| 1 | | | RODENTIA | | |
| | 1 | | Caviidae | | |
| | | 1 | <i>Cavia fulgida</i> | preá | nativa |
| | | 1 | <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> | capivara | nativa |
| | 1 | | Erethizontidae | | |
| | | 1 | <i>Coendou spinosus</i> | ouriço-cacheiro | nativa |
| 1 | | | CHIROPTERA | | |
| | 1 | | Molossidae | | |
| | | 1 | <i>Molossus cf molossus</i> | morcego-de-cauda-livre | nativa |
| | 1 | | Phyllostomidae | | |
| | | 1 | <i>Artibeus</i> sp. | morcego | nativa |
| 1 | | | RODENTIA | | |
| | 1 | | Muridae | | |
| | | 1 | <i>Rattus norvegicus</i> | ratazana | exótica |
| | | 1 | <i>Rattus rattus</i> | rato-doméstico | exótica |
| | | 1 | <i>Mus musculus</i> | camudongo | exótica |
| | 1 | | Sciuridae | | |
| | | 1 | <i>Guerlinguetus ingrami</i> | caxinguelê | nativa |
| 6 | 12 | 17 | TOTAL | | |

Legenda: **O**: Ordem / **F**: Família / **G/E**: Gênero e Espécie.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

CEO. **Centro de Estudos Ornitológicos**. Disponível em: <<http://www.ceo.org.br>>.

FERRÃO-VIDEIRA, F. Classificação - Inventário da Fauna Silvestre do Complexo da Invernada do Barro Branco e Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 2019. **Boletim Interno nº 005/2019 - Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo**. Disponível no link abaixo e no anexo do Boletim Interno do Centro Médico nº C Med-005/2019.
<<https://drive.google.com/file/d/1wK2lGuQc1mSBezYPoCcyxatPHQkAyQ1-/view>>.

FERRÃO-VIDEIRA, F. e FIGUEIREDO, L. F. A. Guia das Aves da Invernada do Barro Branco. **Centro de Estudos Ornitológicos - CEO / Comissão do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico da Polícia Militar - CVMA / C Med**. São Paulo, 2019 / 2020 - ART nº 2019/07065. Disponível em: <<https://1drv.ms/b/s!AuRB2Hr8QtNXoV9WNZDhm6YD0tlh>>.

FERRÃO-VIDEIRA, F., FIGUEIREDO, L. F. A. Levantamento da Avifauna na Invernada do Barro Branco. **Centro de Estudos Ornitológico - CEO**. São Paulo, 2007/2019. Disponível no link abaixo: <http://www.ceo.org.br/relatorios/Invernada_da_PM.xls>.

FERRÃO-VIDEIRA, F., FIGUEIREDO, L. F. A., OLYNTHO, M. S., SILVA, A. A. A. N. Levantamento de Avifauna em Áreas Militares. **Centro de Estudos Ornitológico**. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://www.ceo.org.br/relatorios/areas_militares.htm>.

FERRÃO-VIDEIRA, F. Implantação de Passagem Superior de Fauna Arborícola como conversão de medida compensatória de Termo de Compromisso Ambiental. 2016. 51p. TCC. Pós-graduação MBA/USP em Gestão e Tecnologias Ambientais. **Escola Politécnica – USP/SP**. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B_9_cRZw_Ya4UG9wa2wwTWR2NEU/view?usp=sharing>.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume II - Mamíferos. In: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (Org.). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília: ICMBio. 622p. Disponível no link abaixo: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol2.pdf>.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume III - Aves. In: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (Org.). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília: ICMBio. 709p. Disponível no link abaixo: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol3.pdf>.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume IV - Répteis. In: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (Org.). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília: ICMBio. 252p. Disponível no link abaixo: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol4.pdf>.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume V - Anfíbios. In: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Org.). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília: ICMBio. 128p. Disponível no link abaixo:

<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol5.pdf>.

Nomenclatura e ordem sistemática. **Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO**, versão 2015. Disponível em: <<http://www.cbro.org.br/lista.htm>>.

Prefeitura Municipal de São Paulo, Inventário da Fauna Silvestre do Município de São Paulo. **Secretaria do Verde e Meio Ambiente - Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre/DEPAVE-3. 2018**. Disponível no link abaixo:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/PUB_FAUNA_DIGITAL_2018%20download2.pdf>.

WIKIAVES. **A Enciclopédia das Aves do Brasil**. Disponível em: <<http://www.wikiaves.com>>.

WIKIAVES. Invernada da PM. **A Enciclopédia das Aves do Brasil**. Disponível no link abaixo: <<https://www.wikiaves.com.br/wiki/areas:invernada:inicio>>.

ATUALIZAÇÕES DA PUBLICAÇÃO

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO:

BOLETIM INTERNO C MED 05/2019 - 07 DE FEVEREIRO DE 2019 - PAG. 10/12

8 – CLASSIFICAÇÃO

ATO DO CH CMED

PUBLICAÇÃO

Publicação da Classificação - Inventário da Fauna Silvestre do Complexo da Invernada do Barro Branco e Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 2019. Boletim Interno nº 005/2019 – **Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo**. Disponível no anexo do Boletim Interno nº C Med-005/2019.

SEGUNDA PUBLICAÇÃO:

BOLETIM INTERNO C MED 14/2019 - 11 DE ABRIL DE 2019 - PAG. 11/12

26 - PUBLICAÇÃO

ATO DO CH CMED

PUBLICAÇÃO – RETIFICAÇÃO

Retifico a NBI nº 001/452/19, publicada no Bol Int nº C Med-005/2019 referente à publicação da Classificação - Inventário da Fauna Silvestre do Complexo da Invernada do Barro Branco e Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no que se refere ao nome científico do bugio-ruivo, constante na Tabela III – Lista da Mastofauna encontrada no Complexo da Invernada do Barro Branco – PMESP, de (*Alouatta guariba guariba*) para (*Alouatta clamitans*).

(NBI Nº C Med 2/450/2019, de 09/04/2019).

TERCEIRA PUBLICAÇÃO:

BOLETIM INTERNO C MED 37/2019 - 05 DE SETEMBRO DE 2019 - PAG. 12

22 - PUBLICAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO

CH CMED

Publica-se a nova versão da Classificação - Inventário da Fauna Silvestre do Complexo da Invernada do Barro Branco e Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualizada em agosto de 2019, com 143 (cento e quarenta e três) espécies de fauna silvestre distribuídas em 58 (cinquenta e oito) Famílias e 26 (vinte e seis) Ordens dos grupos: Herpetofauna (répteis e anfíbios); Avifauna (aves) e Mastofauna (mamíferos), conforme documento anexo ao do Boletim Interno C Med 037/2019. (NBI N° C MED 3/450/2019, de 03/09/2019).

QUARTA PUBLICAÇÃO:

BOLETIM INTERNO C MED 005/2020 - 05 DE FEVEREIRO DE 2020 - PAG. 12

19 - PUBLICAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO

CH CMED

Publica-se a nova versão do Inventário da Fauna Silvestre do Complexo da Invernada do Barro Branco, com, ênfase no Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualizada em janeiro de 2020 pelo responsável do inventariamento faunístico, o Biólogo Especialista e Subten PM Fábio Ferrão Videira, com 148 (cento e quarenta e oito) espécies de fauna silvestre distribuídas em 58 (cinquenta e oito) Famílias e 26 (vinte e seis) Ordens dos grupos: Herpetofauna (répteis e anfíbios); Avifauna (aves) e Mastofauna (mamíferos), conforme documento anexo ao do Boletim Interno C Med 005/2020. (NBI N° C MED 1/450/2020, de 30/01/2020).