


## Aves do Estado do Rio de Janeiro: Região meridional do vale do rio Paraíba do Sul - retificação de limites e complementação dos registros inéditos mais antigos

José Fernando Pacheco & Ricardo Parrini – Rio de Janeiro

Pós-Graduação em Biologia Animal, UFRRJ - Instituto de Biologia, Rodovia BR465 Km 7, 23851-970 - Seropédica, RJ, Brasil.



"Grimpeiro, *Leptasthenura setaria*, encontrado apenas em 1957 no Rio de Janeiro"

Foram divulgadas em notas preliminares aqui publicadas (AO 72, 73, 78 e 79), quatro listas de aves que reuniram registros inéditos (não publicados) com a datação mais antiga (no campo), respectivamente, para cada uma das seguintes regiões fluminenses: 1) Norte, 2) Norte do vale do rio Paraíba do Sul, 3) Sul do vale do rio Paraíba do Sul e 4) Costa Verde. Este arranjo regional, de caráter arbitrário, inicialmente planejado numa sub-divisão do Rio de Janeiro em oito regiões (além das quatro, citadas anteriormente, incluiria a região dos "Lagos", "Serrana", "Grande Rio" e Mantiqueira"), pretendia fornecer um esboço do padrão geral de distribuição das aves no Estado. Foi decidido, ultimamente, simplificar este arranjo com a supressão das regiões exclusivamente montanhosas, "Serrana" e "Mantiqueira", incorporando suas vertentes às regiões mantidas, considerando as drenagens correspondentes, se litorânea ou interiorana. Como um exemplo dessa alteração, cabe mencionar a Serra dos Órgãos (antes pertencente à região Serrana), onde a vertente litorânea de Guapimirim passa a integrar a região do "Grande Rio", enquanto a região situada após o divisor d'águas (ao norte do Mirante do Soberbo) se incorpora à (recém ampliada e renomeada) região Setentrional do vale do rio Paraíba do Sul. Desta forma, o novo arranjo adota a divisão do Estado em seis regiões, onde apenas a "Costa Verde" mantém os seus limites conforme a proposição original (AO 78).

A também renomeada e ampliada 'Região Meridional do vale do rio Paraíba do Sul' (antes região Sul) mantém basicamente os mesmos limites propostos (AO 78) com a adição da totalidade do território fluminense da "Mantiqueira", dominado pelo Maciço do Itatiaia, incluindo os seus planaltos e encostas. São também congregadas a esta região as vertentes interioranas da Serra do Mar, existentes entre a Serra das Araras (Pirai) para leste até a Serra do Couto, que serve de limite entre os municípios de Miguel Pereira, Petrópolis e Xerém.

Foram recentemente consultadas as coleções de aves do Museu do Parque Nacional do Itatiaia (MPNI), do Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ) e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), na intenção de buscar registros inéditos ou registros cujos dados de tombamento ainda não haviam sido divulgados minimamente (localidade, altitude, data, coletor e número).

Na discussão a seguir apresentada, as espécies utilizadas como exemplo das afirmativas estão indicadas pelos seus respectivos números.

A maior parte (n=39, #) desta lista de 80 espécies fornece por extenso os dados de peles coletadas por Élio Gouvêa, entre 1950 e 1956, a serviço do MPNI, que haviam sido apenas citadas numa listagem de fauna preparada pelo entomologista Rudolph Barth (1957). Estas peles reunidas por Gouvêa (considerando suas datas de coleta) se constituem nos registros mais recuados da região em questão. Em dois casos (54, 64), parece ter havido o extravio do material mais antigo utilizado por Barth (1957); conquanto os dados aqui fornecidos sejam de data posterior.

Em um caso (14) foi possível obter os dados constantes da ficha, embora não tenha sido possível localizar o material a coleção. Treze peles adicionais do MPNI representam os primeiros registros cronológicos para a região porque foram coletadas após o fechamento (4, 11, 23, 24, 31, 33, 37, 44, 49, 69) do artigo de Barth (1957) ou porque foram omitidas (20, 77) ou identificada erroneamente (25, antes como *A. cajanea*). Dentre as coletadas após o fechamento, as de no. 33, 49 e 24 foram parcialmente antecipadas, respectivamente, por Sick (1969), Pinto (1978) e Sick (1985); enquanto, as de no. 11 e 23 deixaram de ser, inadvertidamente, examinadas por nós.

Não foram localizadas as peles, tampouco as fichas anotadas da coleção do MPNI, de algumas espécies relacionadas por Barth (1957) que se constituíram em registros únicos ou mais antigos para a região: *Porphyryla flavirostris*, *Laterallus exilis*, *Pluvialis dominica*, *Synallaxis frontalis*, *Neopelma aurifrons aurifrons*, *Pitylus grossus*.

Em vista da inexistência das evidências, tais registros devem ser desconsiderados. As peles localizadas das espécies citadas por Barth (1957) a seguir, representam de fato outras espécies (identificação verificada em parênteses): *Aramides cajanea* (*A. saracura*), *Pulsatrix perspicillata* (*P. koenigswaldiana*), *Ramphastos vitellinus* (*R. dicolorus*), *Piculus chrysochlorus* (*P. aurulentus*), *Chamaeza brevicauda* (*C. meruloides*), *Legatus leucophaeus* (*Myiozetetes similis*), *Saltator maximus* (*S. maxillosus*). Os dois exemplares de *Harpia harpyia* procedem, segundo as fichas, do Espírito Santo, embora em uma delas esteja escrito "Itatiaia" por sobre a localidade original.

Outras peles ou fichas não localizadas na coleção do MPNI impediram o conhecimento dos dados básicos e originais do registro cronologicamente mais antigo da região, relacionado por Barth (1957): *Amazonetta brasiliensis*, *Charadrius collaris*, *Aratinga leucophthalmus*, *Dryocopus lineatus*, *Pyroderus scutatus*, *Leistes superciliaris*.

A existência pretérita de material dessas espécies na coleção do MPNI foi corroborada por E. Gouvêa (info. pessoal, 1998).

É oportuno registrar que a listagem de Barth (1957) apresenta outros problemas verificáveis. Há diversas falhas na grafia ou duplicação dos nomes científicos e no ordenamento e inserção das espécies no âmbito das famílias. Em adição, algumas espécies indicadas como novas para o Parque Nacional do Itatiaia, em verdade foram coletadas fora dos limites da Unidade (*Columba cayennensis*, *Hydropsalis torquata*, *Trogon viridis*, *Donacobius atricapillus*) ou já haviam sido registradas (*Cissopis leveriana*).

Emilie Snethlage (1868-1929), a serviço do MNRJ, reuniu material ornitológico no Sítio Walter (na Serra do Itatiaia, 900 m) entre 4 de abril e 4 de maio de 1927 (portanto, antes da criação do Parque); onde dez espécies (45, 46, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 78) coletadas nesta ocasião tiveram o seu primeiro registro para a região documentado.

Três peles, depositadas no MZUSP, coletadas por técnicos do MPNI no início dos anos 1950, constituem-se nos primeiros (35, 79) ou no único (57) registro para a região aqui definida. Um desses registros, o de no. 35, embora antecipado por Pinto (1954), não era conhecido em seus dados básicos.

Oito registros presentes nos diários de campo de Aristides Pacheco Leão (1914-1993), presidente emérito da Academia Brasileira de Ciências, foram considerados como o mais antigo da região. Procedem estes de suas repetidas visitas às fazendas Vargas, Valença (39, 61, 75) e Bela Aliança, Pirai (47, 48, 59, 65, 80) entre os anos de 1964 e 1980. Dois destes (48, 59) estão documentados através de gravações de áudio depositadas no Arquivo Sonoro Elias Coelho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ASEC).

Cinco registros (12, 17, 66, 72, 73) para a região, divulgados por Sick (1985), Gouvêa *et al.* (1991) e Forrester (1993), são disponibilizados aqui segundo pormenores levantados junto aos autores ou no caso de Helmut Sick (1910-1991), ao índice de seu diário em depósito na UFRJ.

Agradecemos ao Prof. Luiz P. Gonzaga, da UFRJ pelo acesso aos documentos de Helmut Sick, arquivos do ASEC e pelas informações acerca do exemplar de *Catharus fuscescens*, por ele capturado em rede; ao Sr. Bruce

C. Forrester, da Escócia, pelas informações atinentes ao registro primeiro de *Sarcoramphus papa* e, por fim, a Bret M. Whitney pelas informações originais de sua observação de *Buteo platypterus*.

Os nomes populares (gerais) seguem aqueles sugeridos por Willis & Oniki (1991) e a nomenclatura científica primordialmente Sick (1997).

- 1 - Mergulhão-pompon, *Tachybaptus dominicus*  
#Vale do Paraíba, município de Itatiaia, 400m, dez 1951, E. Gouvêa (MPNI 79) [Barth 1957]
- 2 - Biguatinga, *Anhinga anhinga*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 3 mar 1950, E. Gouvêa (MPNI 133) [Barth 1957]
- 3 - Garça-branca-grande, *Casmerodius albus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, jan 1950, E. Gouvêa (MPNI 110) [Barth 1957]
- 4 - Garcinha-branca, *Egretta thula*  
Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 19 out 1957 E. Gouvêa (MPNI 1045)
- 5 - Socozinho, *Butorides striatus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, jan 1952, E. Gouvêa (MPNI 256) [Barth 1957]
- 6 - Garça-dorminhoca, *Nycticorax nycticorax*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 5 fev 1952, E. Gouvêa (MPNI 266) [Barth 1957]
- 7 - Socó-boi-ferrugem, *Tigrisoma lineatum*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 3 jan 1950, E. Gouvêa (MPNI 87) [Barth 1957]
- 8 - Socói-vermelho, *Ixobrychus exilis*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 6 mar 1955, E. Gouvêa (MPNI 807) [Barth 1957]
- 9 - Cabeça-seca, *Mycteria americana*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, jan 1953, E. Gouvêa (MPNI 383) [Barth 1957]
- 10 - Jaburu, *Jabiru mycteria*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 13 nov 1954, E. Gouvêa (MPNI 793) [Barth 1957]
- 11 - Colhereiro-americano, *Ajaja ajaja*  
Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, c.1956, E. Gouvêa (MPNI) (não examinado)
- 12 - Urubu-rei, *Sarcoramphus papa*  
Ponte do Maromba, P. N. Itatiaia, set 1989, M. Kessler [Forrester 1993]
- 13 - Irerê, *Dendrocygna viduata*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 30 jan 1950, E. Gouvêa (MPNI 126) [Barth 1957]
- 14 - Marreca-toicinho, *Anas bahamensis*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, mar 1953, E. Gouvêa (MPNI 389) [Barth 1957]  
(extraviado)
- 15 - Marreca-de-bico-roxo, *Nomonyx dominicus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, jan 1952, E. Gouvêa (MPNI 258) [Barth 1957]
- 16 - Gavião-de-cabeça-cinza, *Leptodon cayanensis*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, dez 1952, E. Gouvêa (MPNI s/n) [Barth 1957]
- 17 - Gavião-de-asa-larga, *Buteo platypterus*  
P. N. Itatiaia, 25 dez 1986, B. M. Whitney & R. H. Barth [Forrester 1993]
- 18 - Gavião-caboclo, *Buteogallus meridionalis*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, jan 1950, E. Gouvêa (MPNI 115) [Barth 1957]
- 19 - Caracara-comum, *Caracara plancus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, mar 1950, E. Gouvêa (MPNI 134) [Barth 1957]
- 20 - Falcão-de-coleira, *Falco femoralis*  
Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 27 jan 1956, E. Gouvêa (MPNI 891)
- 21 - Saracura-preta, *Rallus nigricans*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, mar 1952, E. Gouvêa (MPNI 272) [Barth 1957]
- 22 - Saracura-do-banhado, *Rallus sanguinolentus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 25 abr 1956, E. Gouvêa (MPNI 895) [Barth 1957]
- 23 - Saracura-do-banhado, *Rallus maculatus*  
Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, c.1956, E. Gouvêa (MPNI) (não examinado)
- 24 - Saracura-do-mangue, *Aramides mangle*  
Hotel Simon, P. N. Itatiaia, 1150m, 26 set 1959, E. Gouvêa (MPNI 1157) [Sick 1985]
- 25 - Saracura-do-brejo, *Aramides saracura*  
Monte Serrat, P. N. Itatiaia, 780m, mar 1952, E. Gouvêa (MPNI 271)
- 26 - Sanã-carijó, *Porzana albicollis*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, dez 1951, E. Gouvêa (MPNI 247) [Barth 1957]
- 27 - Sanã-parda, *Laterallus melanophaius*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, abr 1954, E. Gouvêa (MPNI s/n) [Barth 1957]
- 28 - Galinha-d'água, *Gallinula chloropus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, fev 1952, E. Gouvêa (MPNI 267) [Barth 1957]
- 29 - Quero-quero, *Vanellus chilensis*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, mar 1954, E. Gouvêa (MPNI 617) [Barth 1957]

- 30 - Maçarico-de-perna-amarela, *Tringa flavipes*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, out 1954, E. Gouvêa (MPNI s/n) [Barth 1957]
- 31 - Narceja-comum, *Gallinago paraguaiæ*  
Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, mai 1956, E. Gouvêa (MPNI 901)
- 32 - Pomba-galega, *Columba cayennensis*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 7 mai 1956, E. Gouvêa (MPNI 897) [Barth 1957]
- 33 - Apuim-de-costa-preta, *Touit melanonotus*  
Monte Serrat, P. N. Itatiaia, 800m, 23 out 1961, E. Gouvêa (MPNI, MZUSP) [Sick 1969]
- 34 - Suindara, *Tyto alba*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, set 1954, E. Gouvêa (MPNI 762) [Barth 1957]
- 35 - Coruja buraqueira, *Athene cunicularia*  
Faz. Valparaíso, Eng. Passos, 570m, 17 jan 1950, R. Simões (MZUSP 34302) [Pinto 1954]
- 36 - Urutau-pardo, *Nyctibius aethereus*  
#Maromba-Mauá, 1540m, 25 abr 1954, E. Gouvêa (MPNI) [Barth 1957]
- 37 - João-corta-pau, *Caprimulgus rufus*  
Monte Serrat, P. N. Itatiaia, 900m, 13 ago 1963, E. Gouvêa (MNRJ, ex-MPNI 1329)
- 38 - Bacurau-chintã, *Caprimulgus parvulus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 25 nov 1952, E. Gouvêa (MPNI 373) [Barth 1957]
- 39 - Beija-flor-de-peito-azul, *Amazilia lactea*  
Faz. Vargas, Valença, 15 abr 1965, A. Pacheco Leão
- 40 - Martim-pescador-grande, *Ceryle torquata*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, jan 1950, E. Gouvêa (MPNI s/n) [Barth 1957]
- 41 - Martim-pescador-verde, *Chloroceryle amazona*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 8 mai 1954, E. Gouvêa (MPNI 708) [Barth 1957]
- 42 - Martim-pescador-pequeno, *Chloroceryle americana*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 1 set 1950, E. Gouvêa (MPNI 163) [Barth 1957]
- 43 - Fevereiro, *Nystalus chacuru*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, abr 1952, E. Gouvêa (MPNI 285) [Barth 1957]
- 44 - Picapau-velho, *Celeus flavescens*  
Benfica, P. N. Itatiaia, 700m, 16 dez 1958, E. Gouvêa (MPNI)
- 45 - Choquilha-de-peito-pintado, *Dysithamnus stictothorax*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 1 abr 1927, E. Snethlage (MNRJ 17080)
- 46 - Choquilha-estrelada, *Myrmotherula gularis*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 1927, E. Snethlage (MNRJ 15813) (não examinado)
- 47 - Chorozinho-de-asa-ruiva, *Herpsilochmus rufimarginatus*  
Faz. Bela Aliança, Piraí, 21 abr 1975, A. Pacheco Leão
- 48 - Pinto-da-mata-coroado, *Formicarius colma*  
Faz. Bela Aliança, Piraí, 1 nov 1980, A. Pacheco Leão (ASEC-APL003)
- 49 - Grimpeiro, *Leptasthenura setaria*  
Pinheiral, 1850-1900m, 9 mar 1957 (MPNI); 1 abr 1957, E. Gouvêa (MZUSP 40746) [Pinto 1978]
- 50 - Pi-pui, *Synallaxis cinerascens*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 13 abr 1927, E. Snethlage (MNRJ 15048)
- 51 - João-de-olho-vermelho, *Phacellodomus erythrophthalmus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 26 set 1954, E. Gouvêa (MPNI 765) [Barth 1957]
- 52 - Limpa-folha-miúdo, *Anabacerthia amaurotis*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 1927, E. Snethlage (MNRJ) (não examinado)
- 53 - Limpa-folha-coroado, *Philydor atricapillus*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 22 abr 1927, E. Snethlage (MNRJ) (não examinado)
- 54 - Limpa-folha-gritador, *Cichlocolaptes leucophrus*  
Monte Serrat, P. N. Itatiaia, 900m, 28 jul 1964, E. Gouvêa (MPNI 1396)
- 55 - Bico-virado-miúdo, *Xenops minutus*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 19 abr 1927, E. Snethlage (MNRJ 14896)
- 56 - Poaieiro-verde, *Phyllomyias virescens*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 1927, E. Snethlage (MNRJ) (não examinado)
- 57 - Guaracava-de-topete, *Elaenia cristata*  
Faz. Valparaíso, Eng. Passos, 570m, 17 jan 1950, R. Simões (MZUSP 34315)
- 58 - Abre-asa-cabeçudo, *Leptopogon amaurocephalus*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 1927, E. Snethlage (MNRJ) (não examinado)
- 59 - Estalador-do-sul, *Corythopsis delalandi*  
Faz. Bela Aliança, Piraí, 2 nov 1980, A. Pacheco Leão (ASEC-APL003)
- 60 - Maria-de-olho-falso, *Hemitriccus diops*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 21 abr 1927, E. Snethlage (MNRJ) (não examinado)
- 61 - Lavadeira-mascarada, *Fluvicola nengeta*

Faz. Vargas, Valença, 6 abr 1969, A. Pacheco Leão  
62 - Maria-velhinha, *Arundinicola leucocephala*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 1 mai 1952, E. Gouvêa (MPNI 295) [Barth 1957]  
63 - Tesourinha-do-brejo, *Gubernetes yetapa*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 1 mai 1952, E. Gouvêa (MPNI 292) [Barth 1957]  
64 - Suiriri-pequeno, *Satrapa icterophrys*  
Monte Serrat, P. N. Itatiaia, 900m, 1 out 1964, E. Gouvêa (MPNI)  
65 - Suiriri-cavaleiro, *Machetornis rixosus*  
Faz. Bela Aliança, Piraí, 4 jul 1964, A. Pacheco Leão  
66 - Tinguauçu-castanho, *Attila phoenicurus*  
P. N. Itatiaia, nov 1971, H. Sick [Sick 1985]  
67 - Tesourinha-do-campo, *Tyrannus savana*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, jan 1950, E. Gouvêa (MPNI s/n) [Barth 1957]  
68 - Andorinha-do-campo, *Phaeoprogne tapera*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 7 mai 1952, E. Gouvêa (MPNI 300) [Barth 1957]  
69 - Andorinha-de-coxa-branca, *Neochelidon tibialis*  
Monte Serrat, P. N. Itatiaia, 780m, 5 ago 1964, J. Geraldo (MPNI 1402)  
70 - Andorinha-morena, *Alopocheilidon fucata*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 7 mai 1952, E. Gouvêa (MPNI 301) [Barth 1957]  
71 - Japacanim, *Donacobius atricapillus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 26 ago 1954, E. Gouvêa (MPNI 739) [Barth 1957]  
72 - Sabiá-ferrugem, *Catharus fuscescens*  
P. N. Itatiaia, 11 fev 1991, L. P. Gonzaga [Gouvêa *et al.* 1991]  
73 - Sabiá-ferreiro, *Turdus subalaris*  
P. N. Itatiaia, nov 1971, H. Sick [Sick 1985]  
74 - Caminheiro-zumbidor, *Anthus lutescens*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 1 mai 1952, E. Gouvêa (MPNI 290) [Barth 1957]  
75 - Vite-vite-de-olho-cinza, *Hylophilus amaurocephalus*  
Faz. Vargas, Valença, 9 out 1966, A. Pacheco Leão  
76 - Vite-vite-de-peito-amarelo, *Hylophilus thoracicus*  
#Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 24 set 1954, E. Gouvêa (MPNI 756) [Barth 1957]  
77 - Gaturamo-rei, *Euphonia cyanocephala*  
Monte Serrat, P. N. Itatiaia, 13 jan 1956, E. Gouvêa (MPNI) (não examinado)  
78 - Saíra-militar, *Tangara cyanocephala*  
Sítio Walter, P. N. Itatiaia, 900m, 4 mai 1927, E. Sneathlage (MNRJ 12254)  
79 - Carretão, *Agelaius cyanopus*  
Vale do Paraíba, mun. Itatiaia, 400m, 4 out 1954, E. Gouvêa (MZUSP 37769)  
80 - Bico-de-lacre-comum, *Estrilda astrild*  
Faz. Bela Aliança, Piraí, 19 mai 1979, A. Pacheco Leão

#### Referências:

- Barth, R. (1957) A fauna do Parque Nacional do Itatiaia. *Bol. Parq. Nac. Itatiaia* 6:1-150.  
Forrester, B.C. (1993) *Birding Brazil. A check-list and site guide*. Irvine: John Geddes Printers.  
Gouvêa, E., G. Alves, E. Schloemp, A. C. Cunha, S. T. Larissa (sic), A. C. Feijó & J. M. Andrade (1991) Anilhamento e recaptura de aves na região do Parque Nacional do Itatiaia. *Resumos I Congr. Bras. Orn.*, Belém:18.  
Pinto, O. M. O. (1954) Aves do Itatiaia. Lista remissiva e novas achegas à avifauna da região. *Bol. Parq. Nac. Itatiaia* (3): 1-87.  
Pinto, O. M. O. (1978) *Novo Catálogo das Aves do Brasil. Primeira Parte: Aves não Passeriformes e Passeriformes não Oscines, com exclusão da família Tyrannidae*. São Paulo: Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais, S.A.  
Sick, H. (1969) Aves ameaçadas de extinção e noções gerais de conservação de aves no Brasil. *Anais Acad. Bras. Ciênc.* 41 (suplemento): 205-229.  
Sick, H. (1985) *Ornitologia Brasileira, uma Introdução*. Brasília: Ed. Univ. Brasília.  
Sick, H. (1997) *Ornitologia Brasileira*. Edição revista e ampliada por J. F. Pacheco. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.  
Willis, E. O. & Y. Oniki (1991) *Nomes gerais para as aves brasileiras*. Américo Brasiliense: Gráfica da região.