

GUIA PARA AVES COMUNS NAS ÁREAS URBANAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.

CENTRO DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS

O "Guia para aves comuns nas áreas urbanas da região metropolitana de São Paulo" foi elaborado para auxiliar na identificação de aves por alunos dos "cursos de observação de aves".

As descrições das aves foram adaptadas de "Birds of South America", de Rodolphe Meyer de Schauensee.


Os desenhos foram adaptados de diversas fontes, relacionadas na Bibliografia. Junto a cada desenho estão as iniciais da obra onde se encontra o original.

Colaboraram na elaboração deste Guia: Luiz Fernando de Andrade Figueiredo (texto, montagem em computador e adaptação dos desenhos de AC) e Maria Martha Argel-de-Oliveira (adaptação dos demais desenhos).


Curso de Observação de Aves. Junho de 1994.
Biblioteca de Embú.

**APOIO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DO EMBÚ.**


ARDEIDAE - *Casmerodius albus*
 Garça-branca-grande
 94 cm. Toda branca. Bico
 amarelo, pés e pernas pretos.



ARDEIDAE - *Egretta thula*
 Garça-branca-pequena
 55 cm. Toda branca. Bico e
 pernas pretos, pés amarelos.




ARDEIDAE - *Butorides striatus*
 Socózinho
 39 cm. Vértice e asas preto
 esverdeado lustroso,
 coberteiras das asas
 margeadas cor de couro. Manto
 verde bronzeo, margeadas
 cinza. Lados da cabeça e
 pescoço cinza, garganta
 branca, frente do pescoço e
 alto do peito brancos
 listrados de preto, barriga
 pardo acinzentado.



ANATIDAE - *Dendrocygna viduata*

Irerê

44 cm. Face e frente do pescoço brancos; nuca, pescoço posterior e faixa na garganta pretos; costas pardo, penas com margens pálidas; uropígio, cauda e centro das partes anteriores preto; peito castanho ferrugem, lados do corpo barrado de preto e branco.




(BV)

CATHARTIDAE - *Coragyps atratus*

Urubú-preto

63 cm. Cabeça e pescoço nus, preto acinzentado. Preto; marca na face inferior das primárias esbranquiçado. Cauda curta, arredondada.




(BV)

ACCIPITRIDAE - *Elanus leucurus*

Gavião-peneira


38 cm. Partes superiores (inclusive penas centrais da cauda) cinza pálido, esbranquiçando na nuca. Extensa marca no ombro e outra menor embaixo do encontro pretas. Lados da cabeça, partes inferiores e penas da cauda, exceto as centrais, branco.



ACCIPITRIDAE - *Buteo magnirostris*

Gavião-carijó


34 a 40 cm. Cabeça, peito e partes superiores pardo a pardo acinzentado a pardo cinza; peito inferior e barriga regularmente barrados de branco e canela. Vexilo interno das rémiges barrado de ferrugem. Cauda parda ou pardo acinzentado com quatro a cinco barras cinza a pardo canela.



FALCONIDAE - *Polyborus plancus*

Cará-cará


51 a 55 cm. Vértice e uma crista achatada pretos. Lados da cabeça, pescoço e garganta branco sujo. Costas anegradadas, barradas de branco sujo. Peito barrado como costas. Barriga e coxas anegradadas. Cauda branco sujo com numerosas barras escuras e uma larga faixa preta terminal. Primárias branco sujo, finamente barradas. Face laranja avermelhado, pernas amarelas.




FALCONIDAE - *Milvago chimachima*

Gavião-pinhé


41 a 46 cm. Cabeça, pescoço e partes inferiores cor de couro, risco preto atrás dos olhos. Encima pardo, pelas com margens mais pálidas. Cauda cor de couro com muitas barras onduladas escuras e ponta preta.




FALCONIDAE - *Falco peregrinus*
 Falcão-peregrino
 38 cm (macho) 51 cm (fêmea).
 Em cima cinza azulado escuro,
 mais escuro no vértice, com
 barras inconspícuas. Larga
 faixa no bigode anegrada,
 parte posterior da região
 malar branca. Garganta e
 peito branco a cor de couro,
 lados da barriga barrado de
 cinza. Cauda como dorso com
 cinco ou seis barras escuras
 e ponta branca.



FALCONIDAE - *Falco sparverius*
 Quiriquiri
 23 a 26 cm. Centro do vértice castanho circundado
 por cinza. Garganta e lados da cabeça brancos,
 lados da cabeça com
 duas listras transversais pretas, pontos negros
 nas coberteiras dos ouvidos. Pescoço posterior e
 costas castanhos, barrados de negro. Cauda
 ferrugem com uma larga barra preta sub-terminal e
 ponta branca. Asas azul cinzento. Partes
 inferiores branco sujo a róseo ou canela, com
 pontos leves ou fortes negros. A fêmea difere do
 macho por ter asas como as costas, vértice
 ferrugem listrado de preto. Embaixo largamente
 listrado de pardo. Cauda com numerosas barras
 pretas.




CHARADRIIDAE - *Vanellus chilensis*
 Quero-quero
 33 cm. Fronte, longa e fina
 crista occipital, pescoço
 anterior, peito e rêmiges
 externas negros. Partes
 superiores verde brônzeo
 acinzentado, coberteiras
 menores da asa verde metálico
 apurpurado; escapulares
 bronze rosado, basalmente
 brancas, distalmente pretas.
 Barriga branca. Base e ponta
 da cauda brancos, resto
 preto.



COLUMBIDAE - *Columbina talpacoti*

Rolinha-caldo-de-feijão


18 cm. Alto e lados da cabeça cinza. Partes superiores ferrugem canela; primárias pretas, coberteiras das asas com pintas pretas, coberteiras inferiores pretas. Garganta branca, resto das partes inferiores canela rosa. Retrizes externas pretas, com ponta canela. A fêmea é parda oliva em cima, coberteiras das asas sarapintadas com preto, partes inferiores pardo cor de couro pálido.



COLUMBIDAE - *Leptotila verreauxi*

Juriti-pupu


30 cm. Fronte branco rosa aprofundando para violeta no vértice e ficando verde apurpurado iridescente no percoço posterior e manto, resto das partes superiores pardo pálido. Garganta, crisco e coberteiras inferiores da cauda brancos, resto das partes inferiores rosa pálido. Penas centrais da cauda como costas, penas exteriores pretas, todas, exceto o par central largamente marginadas com branco.



PSITTACIDAE - *Forpus crassirostris*

Tuim


12 cm. Verde; coberteiras das asas e uropígio azul. Fêmea: toda verde, uropígio um pouco mais claro e fronte algumas vezes tingido de amarelo.



PSITTACIDAE - *Brotozeris viridissimus*

Periquito-rico


25 cm. Verde, amarelado embaixo. Penas centrais da cauda azuladas, consideravelmente mais longas que as demais.



CUCULIDAE - *Piaya cayana*

Alma-de-gato


44 cm. Em cima pardo castanho. Garganta e peito superior cor de couro roseo; resto das partes inferiores cinza, escurecendo para anegrado na barriga e coberteiras inferiores da cauda. Cauda marrom castanho, preto na parte inferior, muito longo, fortemente graduado, largamente branco na ponta. Bico verde amarelado, região orbital vermelha ou amarela.



CUCULIDAE - *Crotophaga ani*

Anú-preto


33 cm. Preto, penas do vértice, manto e peito com margens metálicas; asas e cauda púrpura. Bico fortemente arqueado com um alto e estreito culmem. Iris escura.



CUCULIDAE - *Guira guira*

Anú-branco


39 cm. Vértice ferrugem com listras escuras; dorso superior e coberteiras das asas pardo escuro listrado de branco, resto das costas branco cor de couro. Partes inferiores branco cor de couro com listras estreitas pretas no peito superior. Penas centrais da cauda como costas, resto cor de couro pálido na base, parte central escurecida e com larga ponta branca.



TYTONIDAE - *Tyto alba*

Suindara


40 cm. Disco facial branco, circundado por luma borda escura, região ocular escura. Costas pardo cor de couro, sarapintado de branco; partes inferiores brancas a cor de couro escuro, sarapintado mais escuro. Primárias e cauda barrados com preto e cor de couro.



STRIGIDAE - *Rhyoptinx clamator*

Mocho-orelhudo


37 cm. Ocre cor de couro largamento listrada com preto, costas inferiores e rêmiges com manchas pretas. Disco facial branco cor de couro, bordado com preto. Tufo auricular proeminente, preto no vexilo externo; banda negra ao redor da face. Cauda e rêmiges barradas. Tarso e dedos com penas cor de couro.



STRIGIDAE - *Otus choliba*

Corujinha-de-orelha


23 cm. Em cima pardo, penas com listras estreitas pretas e pintas cor de couro. Máscara bordeada posteriormente com preto. Partes inferiores brancas com listras pretas cruzadas por barras mais estreitas onduladas, penas basalmente canela. Vexilo externo das escapulares e coberteiras inferiores da asa branco cor de couro; vexilos internos das primárias com bandas largas de pardo canela a cinza pálido. Tufo auricular.



STRIGIDAE - *Speotyto cunicularia*

Coruja-buraqueira


22 cm. Única coruja diurna e terrestre. Pernas longas. Em cima pardo sarapintado com branco; embaixo branco esparsamente barrado com pardo. Sem tufo auricular.




CAPRIMULGIDAE - *Nyctidromus albicollis*

Curiango


28 cm. Em cima pardo acinzentado a pardo avermelhado, marcado nas escapulares com pintas pretas aveludadas marginadas com cor de couro, e nas coberteiras das asas com pintas redondas, cor de couro nitido. Primeiras cinco primárias cruzadas com uma larga banda branca. Penas mais externas da cauda pretas, parte do vexilo interno orlado de branco, próximas duas brancas, demais como costas com barras pretas. Fêmea: primárias externas e penas externas da cauda pretos, barrados de ferrugem; próximo par similar mas com ponta branca no vexilo interno.




APODIDAE - *Streptoprocne zonaris*
 Taperuçu-de-coleira-branca
 20 cm. Negro com colar branco
 no pescoço posterior unido a
 larga marca branca no peito.
 Cauda ligeiramente
 forquilhada.



APODIDAE - *Chaetura andrei*
 Taperá-do-temporal
 15 cm. Em cima pardo
 esfumado profundo; embaixo
 pardo esfumado,
 distintamente mais pálido na
 garganta, uropígio e
 coberteiras superiores da
 cauda. Cauda muito curta.




TROCHILIDAE - *Phaethornis pretrei*
 Beija-flor-de-rabo-branco
 12 cm.



TROCHILIDAE - *Eupetomena macroura*

Beija-flor-tesoura


14 cm. Cauda longa, profundamente forquilhada, escura. Toda a cabeça, garganta e peito violeta a violeta azulado, resto da plumagem reluzindo azul esverdeado ou verde bronzeo.



TROCHILIDAE - *Leucochloris albicollis*

Beija-flor-de-papo-branco


10 cm. Partes superiores, mento e larga faixa no peito brilhando verde; garganta, lados do pescoço, barriga e longas coberteiras inferiores da cauda brancas. Retrizes centrais como costas, resto azul metálico com largas pontas brancas.




TROCHILIDAE - *Amazilia lactea*

Beija-flor-de-peito-azul


9 cm. Partes superiores brilhando verde, bronzeo no vértice. Garganta, peito e lados do pescoço brilhando púrpura; estreita linha no centro do peito e barriga branco, lados cinza com discos verdes; centro da barriga cinza; coberteiras inferiores da cauda cinza, margeados de branco.



ALCEDINIDAE - *Ceryle torquata*
 Martim-pescador-grande
 41 cm. Crista e partes superiores cinza azulado; peito e barriga castanho com uma larga faixa branca através da garganta. Rêmiges pretas com uma larga marca branca no vexilo interno. Cauda preta, com uma faixa branca.




ALCEDINIDAE - *Chloroceryle amazona*
 Martim-pescador-verde
 28 cm. Partes superiores verde escuro oleoso. Embaixo branco com uma faixa cinza cruzando o peito. Asas e cauda preta com faixa branca. Fêmea: faixa do peito e lados castanho.



PICIDAE - *Ficumnus cirratus*
 Fica-pau-anão-barrado
 9 cm. Vértice preto, penas centrais com ponta vermelha. Pescoço posterior com pintas brancas. Partes superiores pardo acinzentado, embaixo branco barrado de preto. Cauda preta, penas centrais com vexilo interno branco. Fêmea: vértice preto com pintas brancas.




PICIDAE - *Colaptes campestris*
 Pica-pau-do-campo
 30 cm. Vértice e garganta pretos, lados do pescoço misturado com vermelho (na fêmea pintado de branco). Loro, área em redor dos olhos branco; região malar, lados do pescoço e peito superior amarelo claro. Costas anegradas barradas de branco, partes inferiores brancas, barradas de preto. Cauda preta, penas externas levemente barradas.




(OBI)

FURNARIIDAE - *Furnarius rufus*
 João-de-barro
 20 cm. Partes superiores, asas fechadas e cauda uniformemente pardo ferrugíneo claro. Rêmiges externas pardo escuro com marca pálida na base do vexilo interno, garganta branca, resto das partes inferiores pardo rosado claro.



(ASR)


FURNARIIDAE - *Synallaxis spixi*
 João-teneném
 16 cm. Fronte, vértice e coberteiras das asas ocre laranja. Costas e cauda pardo oliva claro. Supercílio, lados da cabeça, garganta e peito cinza claro, penas da garganta negras na base. Centro do abdômem branco, lados do corpo como dorso.



FURNARIIDAE - *Certhiaxis pallida*

João-pálido

13 cm. Fronte esbranquiçada pintada com preto. Longo supercílio branco. Vértice, costas, asas e cauda pardo avermelhado claro. Partes inferiores branco sujo.



FORMICARIIDAE - *Thamnophilus caerulescens*

Choca-da-mata

15 cm. Cinza azulado, centro das costas misturado com preto, marca dorsal conspicua branca; garganta com pintas brancas e cinza, peito mais claro, garganta e coberteiras inferiores da cauda ocre. Asas anegradas, coberteiras da asa conspicuamente marginadas de branco. Coberteiras superiores da cauda pretas; cauda preta com pontas brancas, retrix mais externa com marca branca na parte média do vexilo externo. Fêmea: partes superiores, asas e cauda olivácea, vértice tingido de ferrugem; coberteiras da asa pretas, com pontas brancas. Garganta e peito oliva acinzentado, resto das partes inferiores cor de couro canela a laranja ocraceo. Cauda oliva, marcada como no macho.




(AC)

TYRANNIDAE - *Camptostoma obsoletum*

Risadinha

11 cm. Em cima oliva; vértice cinza a cinza pardo; loro e um supercílio estreito brancos. Garganta e peito amarelos, tingidos de cinza ou oliva na garganta e peito. Barras duplas nas asas brancas ou cor de couro.




(AC)

TYRANNIDAE - *Elaenia flavogaster*

Maria-é-dia


15 cm. Em cima oliva. Garganta e lados do pescoço branco acinzentado aprofundando a cinza pérola no peito superior, resto das partes inferiores amarelo pálido. Crista com centro branco, conspícua.



TYRANNIDAE - *Todirostrum poliocephalum*

Tec-tec

9 cm. Fronte cinza ardósia empalidecendo para trás. Larga marca amarela brilhante no lado. Costas verde amarelado brilhante; embaixo amarelo brilhante. Barras duplas na asa e margens das rémiges amarelas. Retrizes pardo acinzentado, margeado de verde amarelado.



TYRANNIDAE - *Pyrocephalus rubinus*

Verão


14 cm a 15 cm. Alto do vértice e partes inferiores vermelho. Lados da cabeça, costas, asas e cauda pardo fuliginoso a preto fuliginoso. Fêmea: em cima pardo acinzentado escuro; garganta e peito brancos, peito listrado com pardo escuro; peito inferior e barriga vermelho rosa.



TYRANNIDAE - *Xolmis cinerea*

Maria-branca


22 cm. Em cima cinza, fronte e um supercílio curto branco. Bigode preto; garganta e barriga brancas, contrastando com o peito cinza. Asas pretas; base das rêmiges, coberteiras inferiores da asa e bordas das terciárias branco. Cauda preta, base das penas brancas, pontas das penas branco cinzendo.



TYRANNIDAE - *Machetornis rixosus*

Suiriri-cavaleiro


19 cm. Vértice e nuca cinza claro, crista escarlate alaranjada oculta. Costas pardo oliva claro, garganta branco creme, restos das partes inferiores amarelas. Cauda parda, dois pares externos de penas com marca pálida na ponta do vexilo interno.



TYRANNIDAE - *Pitangus sulphuratus*

Bem-te-vi


23 cm. Vértice e lados da cabeça pretos, crista amarela, vértice circundado por uma faixa branca. costas e asas pardas, coberteiras e rêmiges margeadas de ferrugem. Cauda parda escura, margeadas de ferrugem. Garganta branca, resto das partes inferiores amarelo brilhante. Muito parecido com *Megarhynchus pitangua*. Difere pelo bico que é estreito e alto, ao invés de largo e achatado, como o daquele.



TYRANNIDAE - *Tyrannus melancholicus*

Suiriri


21 cm. Partes superiores, garganta e peito cinza claro, barriga amarela. Crista laranja oculta. Asas anegradas, coberteiras da asa e rêmiges internas margeadas de branco acinzentado. Cauda preta, forquilhada.



TYRANNIDAE - *Tyrannus savanna*

Tesourinha


38 cm. Cauda preta, muito longa, profundamente forquilhada, muito graduada. Alto e lados da cabeça pretos, crista amarela semi-escondida. Em cima cinza, uropígio preto. Embaixo branco.



HIRUNDINIDAE - *Notiochelidon cyanoleuca*

Andorinha-azul-e-branca


12 cm. Partes superiores e coberteiras inferiores da cauda azul metálico lustroso; partes inferiores brancas. Cauda forquilhada. Pés escuros.



TROGLODYTIDAE - *Troglodytes aedon*

Corruíra

11 cm. Em cima pardo avermelhado a pardo cinza, costas com algumas finas barras pretas. Loros mais claros; supercílio estreito, pouco perceptível, esbranquiçado a cor de couro. Asas e cauda barrados com preto, cauda como costas ou ferrugem. Embaixo branco acastanhado a róseo canela claro, coberteiras inferiores da cauda barrada ou não.




(Bv)

MIMIDAE - *Mimus saturninus*

Sabiá-do-campo

27 cm. Em cima pardo escuro, penas margeadas com cinza escuro, embaixo branco. Largo supercílio branco, listra através dos olhos preta. Asas e cauda pardo anegrado, coberteiras das asas e rémiges margeadas de branco, cauda com larga marca branca terminal.



TURDIDAE - *Platycichla flavipes*


Sabiá-una

21 cm. Cabeça, garganta, peito, asas e cauda pretos; resto da plumagem cinza azulado. Iris pardo escuro, bico e pernas amarelos. Fêmea: Partes superiores, asas e cauda pardo oliváceo; partes inferiores pardo claro, listrado de escuro na garganta; centro do abdômem mais claro. Iris parda, anel ocular amarelo. Bico escuro, pernas amarelas.




(AC)


TURDIDAE - *Turdus rufiventris*
 Sabiá-laranjeira
 26 cm. Cabeça e cauda pretas;
 costas e asas cinza escuro.
 Peito e coberteiras
 inferiores da cauda cinza
 pálido, resto das partes
 inferiores ferrugem laranja.




TURDIDAE - *Turdus amaurochalinus*
 Sabiá-poca
 25 cm. Partes superiores,
 asas e cauda pardo oliva
 escuro, olhos anegrados.
 Garganta branca, listrada de
 anegrado; marca na base da
 garganta branca; peito e
 lados cinza esfumado
 pálido, centro da barriga e
 coberteiras inferiores da
 cauda brancos. Coberteiras
 inferiores da asa canela
 pálido. Bico amarelo com
 ponta preta.



FLOCEIDAE - *Passer domesticus*
 Pardal
 15 cm.




ESTRILDIDAE - *Estrilda astrild*
Bico-de-lacre
11 cm.



(AT)

EMBERIZIDAE - *Molothrus bonariensis*
Chopim


22 cm. Cabeça, pescoço, peito e peito superior pretos com um brilho púrpura ou púrpura azulado; costas inferiores e abdômem com menos púrpura, mais azul. Asas e cauda brilhando azul com esverdeado. Fêmea: pardo acinzentado em cima, e bem mais claro embaixo, garganta e supercílio esbranquiçado.



(BV)

EMBERIZIDAE - *Parula pitiayumi*
Mariquita

10 cm. Partes superiores e lados da cabeça cinza azulado, oliva amarelado no centro das costas; região ocular enegrecida. Asas e cauda cinza; barras duplas e marca nas retrizes externas brancas. Embaixo amarelo brilhante, garganta e peito queimado com laranja.




(OBI)

EMBERIZIDAE - *Coereba flaveola*

Cambacica

11 cm. Partes superiores cinza fuliginoso a pardo fuliginoso a anegrado, uropígio amarelo a amarelo oliva; longo supercílio, espelho na asa e coberteiras inferiores da cauda brancos. Garganta cinza pálido, restos das partes inferiores amarelo limão brilhante. Bico curvo.




(OBI)

EMBERIZIDAE - *Dacnis cayana*

Sai-azul

14 cm. Bico reto, pontudo. Azul turquesa a azul apurpurado escuro. Fronte, loros, garganta, centro das costas, asas e cauda pretos. Fêmea: verde grama, vértice azul, garganta cinza.




(OBI)

EMBERIZIDAE - *Tersina viridis*

Sai-andorinha

14 cm. Azul apurpurado contra a luz, verde azulado a favor da luz. Máscara, garganta, barras ao lado do corpo pretos. Barriga e coberteiras inferiores da cauda brancos. Fêmea: verde grama. Face a garganta sarapintado com pardo acinzentado; centro do abdômem e barras nos flancos amarelo pálido.



(BV)

EMBERIZIDAE - *Euphonia chlorotica*

Gaturamo fi-fi

11 cm. Púrpura metálico; ficando azulado metálico no baixo dorso e coberteiras superiores da cauda, asas e cauda. Vértice e partes inferiores amarelo limão. Dois pares externos de penas da cauda com vexilo internos brancos. Fêmea: verde oliva em cima; amarelo oliva embaixo, centro da barriga amarela.




(AC)

EMBERIZIDAE - *Tangara cayana*

Saíra-cabocla

15 cm. Partes superiores amarelo ocre brilhante. Lados da cabeça, garganta, peito e centro do abdômem pretos, lados do corpo ocre brilhante. Penas das asas e cauda pretas, margeadas de azul.




(VNA)

EMBERIZIDAE - *Thraupis sayaca*

Sanhaço-cinza


18 cm. Azul pálido, mais escuro nas costas. Asas e cauda mais azul escuro que resto da plumagem. Ombros azuis.



EMBERIZIDAE - *Thlypopsis sordida*

Bonito-canário


17 cm. Vértice e nuca ferrugem laranja; lados, região ocular e garganta amarelos. Em cima cinza, tingido de oliva; embaixo branco, tingido de cinza ou cor de couro. Fêmea: em cima amarelado, partes inferiores amarelo manteiga.



EMBERIZIDAE - *Saltator similis*

Trinca-ferro


21 cm. Vértice e manto oliva, resto das partes superiores cinza escuro. Longo supercílio e garganta branca a branco cor de couro. Bigode preto. Garganta cinza, peito e barriga cor de terra claro.



EMBERIZIDAE - *Sporophila caerulescens*

Coleirinha

12 cm. Partes superiores cinza escuro a cinza pardo, mais pardo nas asas e cauda. Garganta superior e faixa peitoral preta, garganta inferior branca; bigode, peito e barriga brancos.




(VNA)

EMBERIZIDAE - *Volatinia jacarina*

Tisiu


10 cm. Uniformemente preto azulado brilhante. Fêmea: parda em cima; embaixo esbranquiçada, listrada de pardo.



EMBERIZIDAE - *Zonotrichia capensis*

Tico-tico


15 cm. Cabeça com uma ligeira crista, cinza com duas largas listras laterais coroadas pretas; listra pós-ocular, linha abaixo das coberteiras dos ouvidos e marca nos lados do peito pretas. Colar nugal extendendo-se aos lados do peito castanho ferrugem. Costas pardo avermelhado, listradas de preto; embaixo branco. Coberteiras médias e maiores das asas com pontas brancas. Cauda pardo escuro. Fêmea: sem crista.



FRINGILLIDAE - *Carduelis magellanica*

Pintassilgo

13 cm. Cabeça e pescoço pretos; costas amarelo oliva; partes inferiores e uropígio amarelo brilhante. Asas e cauda preto pardacento, bases das rêmiges e retrizes amarelos. Fêmea: vértice e costas oliva, uropígio amarelo brilhante; garganta e peito oliva, barriga amarelo escuro. Asas e cauda como no macho.



BIBLIOGRAFIA

- BELTON, W. Aves silvestres do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. 1982. (ASR)
- DUNNING, J.S. South American land birds. Newtown Square, Harrowood. 1982. (SAL)
- HÖFLING, E., Camargo, H.F.A. Aves no campus. São Paulo, EDUSP. 1994. (AC)
- IHERING, R. von. Da vida de nossos animais. Porto Alegre, Rotermund & Co. 1946. (VNA)
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. & PHELPS, W.H. Birds of Venezuela. Princenton, Princenton University. 1978. (BV)
- NAROSKY, T. Aves argentina: guia para reconocimiento de la avifauna bonaerense. Buenos Aires. Albatros. 1978. (AA)
- ROBBINS, C.S., BRUNN, B. & ZIM, H.S. Birds of North America. Nova Iorque, Golden Press. 1966. (BNA)
- ROOTS, C. Aves tropicais. São Paulo, Melhoramentos EDUSP. (Série "Prisma"). 1979. (AT)
- SICK, H. Ornitologia brasileira: uma introdução. Brasília, UNB. 1985. (OBI)